

新刊醫林狀元壽世保元

新刊醫林狀元壽世保元戊集卷之五

太醫院吏目金谿雲林龍廷賢子才編

男 龍定國 校

南雍太學生蓋印周文卿光靈堂

眩暈

脈風寒暑濕氣鬱生涎下虛上實皆暈而眩風浮寒緊濕細暑虛涎眩而滑虛脈則無治眩暈法尤當審諦先理痰氣次隨證治

眩者言其黑暈言其轉言其昏眩暈之與冒眩其義一也其狀目閉眼暗身轉耳聾如立舟車之上起則欲倒蓋虛極乘寒得之亦不可一途而取軌也風則有汗寒則掣痛暑則熱悶濕則重滯此四氣乘虛而眩暈也喜怒哀樂悲恐憂思鬱而生痰隨氣上厥七情致虛而眩暈也

欲過度腎家不能納氣歸原使諸氣逆奔而上此眩暈之出於氣虛也
 明矣吐衄漏崩肝家不能收攝榮氣使諸血失道妄行此眩暈之生於
 血虛也又明矣以致新產之後血海虛損或瘀不行皆能眩暈是可不
 推尋致病之因乎治法隨機應敵其間以升降鎮墜行焉最不可妄施
 汗下然而眩暈欲解自汗則有之若諸逆發汗劇者言亂目眩與夫少
 陰病下利止而頭眩時時自胃者此虛極而脫也識者將有採薪之憂
 清暈化痰湯 主方治眩暈之總司也

陳皮 去白

半夏 薑汁炒

白茯苓

去皮各一錢半 枳實 麩炒一錢

川芎

黃芩 酒炒各八分

白芷

細辛

南星 薑汁炒

防風

羌活各七分

甘草三分

右剉一劑生薑三片水煎服以此作丸亦可○氣虛加入參七分白朮
 去蘆一錢○血虛加當歸倍川芎○有熱加黃連薑炒七分

○一論頭旋眼黑惡心煩悶氣短促上喘無力言語心神顛倒目不敢開

如在風雲中頭苦裂身重如山四肢厥冷不得安睡此乃胃氣虛極停痰而致也

半夏白朮天麻湯 方見頭痛

○一論勞役之人饑寒眩暈者脉虛弱也

補中益氣湯 方見內傷 依本方加半夏天麻白芍熟地黄○一眩暈傷氣

虛有濕痰者依本方去柴升加白茯苓川芎半夏天麻桔梗白芷

○一論陰虛火動眩暈者脉必數也

清離滋坎湯 方見勞瘵 依本方加川芎天麻山梔竹瀝少許

○一論真陽不足上氣喘急氣短自汗虛極欲倒如坐舟車眩暈手足冷

脉沉細也

參附湯

人參 五錢 大附子 炮三錢

右剉作二劑生薑十片水煎熱服

○一論眩暈之症。因氣虛痰火炎上故也。

清陽除眩湯

人參 六分

白朮 去蘆 一錢

白茯苓 一錢 陳皮 一錢

半夏 湯泡 一錢

天麻 八分

旋覆花 八分 檳榔 八分

甘草 四分

右剉一劑。生薑三片。水煎服。

○一論肥白人。日常頭眩眼昏。卒時暈倒者。名曰痰暈。

清痰祛眩湯

南星 薑泡

半夏 薑炒

天麻

蒼朮 米泔浸 川芎

陳皮

茯苓 去皮

桔梗

枳殼 去穰 烏藥

酒芩

羌活 各八分 甘草 三分

右剉生薑水煎。臨服入竹瀝薑汁。全服。

○一論體虛之人。下時為寒所中。口不能言。眩暈欲倒。手足厥冷。

薑附湯

乾薑一兩 大附子生去皮臍一枚

右剉每五錢水煎溫服。

○一論一切失血過多眩暈不醒者

芎歸湯

川芎

當歸各等分

右剉水煎溫服。○虛甚加製過大附子。

○一論氣血兩虛而挾寒作頭自眩暈者

十全大補湯方見補益依本方如有痰加陳皮半夏。

○一治一人形體魁梧不慎酒色因勞怒頭暈仆地痰涎上壅手足麻痺

口乾引飲太脉洪數而虛予以爲腎經虧損不能納氣歸原而頭暈不

能攝水歸元而爲痰陽氣虛弱而麻痺虛火上炎而作渴以補中益氣

湯合地黃丸料治之而已。

○一人氣短痰暈服辛香之劑痰盛遺尿兩尺浮大按之如無予以爲腎

家不能納氣歸元香燥致甚耳用八味丸料三劑而愈八味丸方見補起左三脉洪而有力予爲足三陽虧損用補中益氣湯加麥門五味及加減八味丸而愈。

○一大方痰暈湯

法製半夏一錢 橘紅一錢 赤茯苓一錢 黃芩酒洗七分

黃連五分 黃柏酒炒七分 知母七分 石膏一錢

白朮一錢五分 薄荷五分 川芎五分 甘草炙五分

右剉一劑生薑三片水煎臨臥服。

○一生員形體魁梧不慎酒色因勞怒頭暈仆地痰涎上湧手足麻痺口乾引飲木脉洪數而虛余以爲腎經虧損不能納氣歸源而頭暈不能擲水歸源而爲痰陽氣虛熱而麻痺虛火上炎而作渴補中益氣合六味丸料治之而愈其後或勞役或入房其病卽作用前藥隨愈。

○一孟遺氣短痰壅服辛香之劑痰盛溝尿兩尺浮大按之如盤余以爲腎家不能納氣歸元香燥致甚用八味丸料三劑而愈

○一孫都憲形體豐厚勞神善怒面赤陽色口渴吐痰或頭目眩暈或熱從腹起左三脈洪而有力右三脈洪而無力余謂是三陰虧損用補中益氣加麥門五味及加減八味丸而愈

十全大補湯見補益六味丸見補益補中益氣湯見內傷八味丸見補益

麻木

脈浮而濡屬氣虛關前得之麻在上體關後得之麻在後體也脈浮而緩屬濕爲麻痺脈緊而浮屬寒爲痛痺脈流而芤屬死血爲木不知痛癢內經曰風寒濕三氣合而爲痺故寒氣勝者爲痛痺濕氣勝者爲痺問曰留着不去四肢麻木拘攣也經又曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者病久入深榮衛之行遊經絡時疎故不痛皮膚不榮故

為不仁。夫所謂不仁者，或周身，或四肢，唧唧然，麻木不知痛癢，如繩扎縛初解之狀。古方名為麻痺者是也。丹溪曰：麻是氣虛，木是濕痰死血。然則曰麻曰木者，以不仁中而分為二也。雖然，亦有氣血俱虛，但麻而不木者，亦有虛而感濕，麻木兼作者。又有因虛而風寒濕，三氣乘之，故周身掣痛，兼麻木併作者。古方謂之周痺，治法宜先汗而後補也。醫者宜各以類推而治之，不可執一見也。

○一論麻木遍身手足俱麻者，此屬氣血兩虛，宜加味八仙湯。

- | | | | |
|--------|----------|-----------|----------|
| 當歸 酒洗 | 川芎 | 熟地黃 各七分 | 白芍 酒炒 八分 |
| 人參 六分 | 白朮 去蘆 二錢 | 白茯苓 去皮 一錢 | 陳皮 八分 |
| 半夏曲 七分 | 桂枝 三分 | 柴胡 四分 | 川羌活 五分 |
| 防風 五分 | 秦艽 六分 | 牛膝 六分 | 甘草 炙 三分 |
- 右剉一劑，生薑一片，棗一枚，水煎，食遠服。○氣虛加黃芪蜜炒八分。

○一論麻是渾身氣虛也

加減益氣湯

黃芪蜜炒人參

白朮去蘆陳皮

當歸銹各一升麻

柴胡

木香各五分香附

青皮去穢

川芎各八分

桂枝

甘草各三分

右剉一劑生薑煎服。

○一論十指麻并面目皆麻此亦氣虛也。

補中益氣湯

依前方去青皮川芎桂枝加麥門冬羌活防風烏藥共刺

○一論木是濕痰死血也。

雙合湯

當歸

川芎

白芍

生地黃

陳皮

半夏姜炒

白茯苓去皮

桃仁去皮尖

紅花三分

白芥子一錢

甘草三分

右剉，丁剉薑十片，水煎熟，入竹瀝薑汁同服。

○一論手足麻痺，因濕所致，

香蘇散方見感冒。依本方加蒼朮、麻黃、桂枝、白芷、羌活、木瓜。

○一論感風濕，手膊或痛或木，或遍身麻木。

五積散方見中寒。

○一論婦人七情六鬱，氣滯經絡，手足麻痺。

開結舒經湯

紫蘇

陳皮

香附

白烏

川芎

蒼朮 米泔浸

羌活

南星

半夏

當歸

桂枝

甘草 三分

右剉生薑三片，入薑汁竹瀝服。

○一論口舌麻木，延及嘴角，頭面亦麻，或嘔吐痰涎，或頭眩眼花，惡心遍身麻木。

止麻消痰飲

黃連 半夏 瓜蒌仁 黃芩 白茯苓 桔梗

枳殼 麩炒陳皮 天麻 細辛 南星 甘草

右剉生薑三片水煎服。○血虛加當歸。○氣虛加入參。○亦有十指麻木胃中有濕痰死血加蒼朮白朮少佐熟附子。行經中死血者四物湯加桃仁紅花韭汁忌生冷魚腥發風發熱之物。

○一論十指疼痛麻木不仁。

大附子木香各等分。每服三錢薑三片水一碗煎七分服。

○一論婦人遍身麻痺謂之不仁皆因血分受風濕所致用祛風散送下

五補丸

祛風散

生川烏 白朮 去蘆 白芷 各三錢 甘草 二錢

右為細末酒調吞下五補丸

五補丸

黃芪蜜炒

人參 五錢

附子 一個

當歸 三錢

白芍酒炒 五錢

右為細末，煉蜜為丸，如梧子大，每服五七十九丸，祛風散送下。

○一論不仁者，謂不柔和也。癱痺不知針灸，不知是也。經曰：諸虛乘寒而鬱，胃不仁，蓋其血氣虛弱，不能清流於一身，於是正氣為邪氣所伏，故肢體頑麻，不知痛痒，寒過厥如死，厥而鬱且胃也。用桂麻各半湯，不愈者，補中益氣湯入薑汁，設或身汗如油，喘不休，喘而直視，水漿不入者，此為命絕也。

○一論風熱血燥，皮膚搔痒，頭面手足麻木。

清涼潤燥湯

當歸酒洗

生地黄各一錢半

黃連

黃芩

白芍煨

川芎各一錢

天麻

羌活

荆芥各八分

細辛六分

甘草五分

右剉水煎，食遠服，麻甚加川烏炮三分。

○一論面上木處可將桂枝為末用牛皮膠和少水化開調敷之厚一二分若脚底硬木處可將牛皮膠鎔化入生薑汁調和仍入南星末五錢和勻用厚紙攤貼二三分乘半熱裹貼脚底上用溫火烘之此外治法

○一治兩手指麻木四肢困倦怠惰嗜臥乃熱傷元氣也
 黃芪八錢 人參五錢 白芍二錢 柴胡二錢半

升麻二錢 五味子十個 四生甘草五錢 炙甘草二錢

右剉水煎稍熱空心服。

○一治兩腿麻木沉重無力多汗喜笑口中涎下身重如山語聲不出右寸脉洪大。

黃芪三錢 膏歸二錢 蒼朮四錢 陳皮五錢

藥本二錢 柴胡三錢 升麻 黃柏酒炒一錢

知母酒炒一錢 五味子一錢 生甘草二錢半

右每劑五錢水煎空心服少待以早飯壓之

○一治皮膚間有麻米乃肝氣不行故也。

黃芪一兩 白芍一兩半 猪皮去白一兩半 澤瀉五錢

炙甘草一兩

右剉水煎溫服。

癲狂

癲脈搏太滑者生沉小緊急不治。○狂脈實大生沉小死。○癲脈虛可治實則死。

內經曰巨陽之厥則腫首頭重足不能行發為駒仆而暴仆也。是蓋陽氣逆亂故令人卒然暴仆而不知人氣復則甦此則癇之類也。又曰陽明之厥則癲疾欲走呼腹滿不得臥面赤而熱妄見妄言。又曰甚則棄衣而走登高而歌踰垣上屋為置不避親疎是蓋得之於陽氣太盛胃與大腸實熱燥火鬱結于中而為之耳。此則癲狂之候也。曰癲曰狂公而

言之亦有異乎。難經謂重陰者癲，重陽者狂。素問註云：多喜爲癲，多怒爲狂。然則喜傷於心而怒傷於肝，乃二臟相火有餘之症。難經陰陽之說，恐非理也。大抵狂爲痰火實盛，癲爲心血不足，多爲求望高遠，不得志者有之。癩病，獨主乎痰，因火動之所作也。治法癩者宜吐，狂宜下，癲則宜安神養血兼降痰火。雖然此三証者若神脫而目眩如愚痴者，縱有千金我酬吾未如之何也已矣。

癲者喜笑不常顛倒錯亂之謂也。

狂者大開目與人語，所未嘗見之事爲狂也。又云狂者狂亂而無正也。讖語者，合目自言，日用常行之事爲讖也。又蓄血症，則重復語之。

鄭聲者，聲顛無力，不相接續，造字出於喉中爲鄭聲也。

陰附陽則狂，陽附陰則癲。脫陽者見鬼，脫陰者目盲。

○一論癲者心血不足也。此方主癲狂喜笑不常。

養血清心湯

人參

白朮 去虛

白茯苓 去皮

遠志 去心

酸棗仁 炒

川芎

生地黄

石菖蒲 各一錢

當歸

麥門冬 去心各一錢半 甘草 五分

右剉一劑水煎服。

○一論狂者痰火實盛也宜後清心滾痰丸主之若風熱實盛者宜

防風通聖散方見中風依本方加牡丹皮生地黄桃仁主之治一切大風

癩狂之疾。

○一論喜笑不休者心火之盛也。

以海鹽二兩火燒令紅研細以河水一大碗煎三五沸待氣三次吸

之以鈔探吐熱痰次服。

黃連解毒湯方見感冒依本方加半夏竹葉竹瀝姜汁少許。

○一論婦人癩疾歌唱無時踰垣上屋者乃營血迷於心包所致也。

加味逍遙散

當歸

白芍

白朮

白茯苓

柴胡

生地黄

遠志

桃仁

蘇木

紅花

甘草

右剉一劑煨薑一片水煎服有熱加小柴胡湯生地辰砂水煎服。

○一論發狂無時披頭大叫欲殺人不聽米火古人治狂謂之失心苦參

主心腹結氣故足以治時熱狂言

苦參丸

苦參為末煉蜜為丸如梧子大每服二三十丸薄荷湯送下

○一論一切癩癩風狂或因驚恐怖畏所致及婦人產後血虛驚氣入心

并室女經脉通行驚邪蘊結煩服比比經効

抱膽丸

水銀二兩

朱砂一兩研鉛一兩半

乳香一兩研

右將鉛入銚內水銀結成砂子次下朱砂滴乳香熟用柳木棍研勻丸

如芡實大每丁丸空心并花水吞下病者得睡切莫驚動此來即安再服丁丸除根。○丁方薄荷湯化下亦可。

○一論癩狂朱心不寐此方用朱砂能鎮心安神酸可使收引故棗仁能斂神歸心香可便利疑故乳香能豁達心志許學士加入人參亦謂人參能寧心耳。

寧志膏

辰砂一兩 酸棗仁炒五錢 乳香五錢 加入參一兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大每丁丸薄荷湯化下。

○一論癩狂朱心此病因暴鬱得之痰涎包絡心竅此藥能開鬱痰。

白金丸

白礬三兩 鬱金七兩

右為末米糊丸每服五十九丸溫水送下。

○一論癩狂五癩驚悸丁切怪症此皆痰火實盛也。

清心液痰丸

大黃酒蒸四兩

黃芩四兩

青蒙石煨五錢沉香二錢半

牙皂五錢

犀角五錢

麝香五分

朱砂五錢為末

右為細末水丸每服四五十九滾水送下

○一論心風者何蓋君火在心因怒發之相火助盛痰動于中脇氣上攻

迷其心竅則為癲為狂所怒之事膠固於心輒自言談失其條序謂之

心風與風何干也若痰不盛者則有感亦輕

○一論久患心風癲狂健忘怔忡朱志及恍惚驚怖入心神不守舍多言

不定此藥大能安神養血寧心定志

紫河車丁具長流水洗淨慢火焙乾為末煉蜜為丸空心酒送下

○丁人癲狂亂打走叫上房用瓜蒂散吐出其痰數升又以承氣湯下之

○丁人氣心風即是痰迷心竅發狂亂作用真花蒙石煨黃酒滓一次為

末每服一錢黃酒調下

○一論癩狂五癩眩暈時作時止痰涎壅盛心神昏憤此屬氣血虛而挽

風痰鬱火也

驅風豁痰湯

人參

白朮 去蘆

白茯苓 去皮

半夏 姜炒

陳皮

枳實 麩炒

當歸 酒洗

川芎

白芍 酒炒

懷生地黃

桔梗 去蘆

南星

瓜蒌仁

白附子

僵蚕

天麻

遠志 甘草水
泡去心 黃芩 酒炒

黃連 姜炒

甘草

右剉一劑生薑五片水煎溫服

○一癩狂健忘失志及恍惚驚怖入心神不安多言不定一切氣血虛

損用紫河車丸補藥內服之天能安神養血寧志治健忘驚悸怔忡不

寐以六味丸加遠志石菖蒲人參白茯苓當歸酸棗仁炒

○一治心恙狂惑

用無灰酒二碗真麻油四兩共和勻楊枝二十條逐下條攪下下

攪通楊枝直候油消相和如膏煎至七分狂者強灌之令熟睡或吐或不吐覺來即醒

○一治狂言鬼語

用蝦蟆一箇燒為末酒調服

○一治癲狂諸病

將軍湯

大黃四兩酒浸一宿

右用米三升前之分作三服

癲狂病者多怒為癲多喜為狂癲者精神不守言語錯亂妄見妄言登高罵詈是也狂之病始發少臥少飢自賢自貴妄笑妄動登高而歌乘衣而走是也癲病者毒邪之并於肝狂病者貴邪之并於心也此皆實症宜瀉而不宜補故用大黃以瀉之取其苦寒無物不降可以為實又必數日後方可與食但得寧靜便為吉兆不可見其瘦弱減食以溫藥

補之。及以飲食飽之病必再作。戒之戒之。緩與之食。方為得體。故曰損其穀氣。則病易愈。所以然者。食入于陰。長氣于陽。故也。又宜滾痰丸之。

○一治顛狂不止。得之驚憂極者。用甜瓜蒂半兩。為末。每服一錢。井水調。一盞投之。即大吐。後熟睡。勿令驚起。神效。

○一治邪狂。癲癩不飲。眠妄行不止。用白雄雞二隻。煮熟。五味調和。作羹。

○一治因驚憂。朱心。或思過多。氣結不散。積成痰涎。留滯心包。窒塞心竅。以致狂言妄語。叫呼奔走。

雄朱丸

朱砂

類魂者二錢半研

雄黃

明淨者研二錢半

白附子 一錢

右和勻。以猪心血和為丸。如梧桐子大。另用朱砂為衣。每服三粒。用人

參葛蒲煎湯送下。常服。一粘能安魂定魄。補心益智。

○一牧童小子。平日口中胡說。一片鬼話。今入驚駭子。診之。脈洪大。此實熱也。以斑蝥數條。研爛。井水調服。立愈。

癰證

脈虛弦為驚為風癰。

癰證者發則止地悶亂無知嚼舌吐沫背反張目上視手足搐搦或作不
音聲者是也蓋癰疾之原得之于驚或在母腹之時或在有生之後必
以驚恐而致疾蓋恐則氣下驚則氣亂恐氣歸腎驚氣歸心併於心腎
則肝脾獨虛肝虛則生風脾虛則痰毒極而通其發也暴故冷風痰上
湧而癰作矣內經曰然所以令人止地者厥氣併于上上實下虛清濁
倒置故令人止地悶亂無知者濁邪于乎天君而神明壅閉也舌者心
之苗而脾之經絡連于舌本陽明之經絡入上下齒縫中故風邪實于
心胃則舌自挺風邪實于陽明則口自噤下挺下噤故令嚼舌吐沫者
風熱盛于內也此風來潮潤之象背反張目上視者風在太陽經也足
太陽之經起于睛明橫脊而下風邪于之則實而勁急故目上視而背

反張也手足搐搦者屬肝木肝木主筋風熱盛于肝則一身之筋牽攣故令手足搐搦也搐者四肢屈曲之名搦者十指開握之義也或作六畜聲者風痰鼓其氣竅而聲自變也聲之弄笛為六孔閉塞不同而官商別異是也

夫痲之為病角弓反張手足搐搦口吐涎沫俗云猪圈風也亦因金衰木旺生風外由驚邪入內以致之蓋痲病一月數發者易治周年一發者難治虛實之判也實則即攻之虛者先補可也治法當先以瓜蒂散吐之用甜瓜蒂為末每服一錢井水調下蓋投之即大吐後熟睡勿令驚起即効後以湯藥調理

○一論痲症宜下宜吐茶子喜湧而能吐頑痰宜取一升搗爛煎湯服得木吐便止

○一論諸痲神智不寧時發狂躁多言好怒面容不澤定神至寶湯

生地黃五錢 煅橘紅

黃連 遠志去心

枳實煨炒 瓜蒌仁

右劉生薑三片水煎服。

○一論癩者痰涎壅滯然也。

加減道痰湯 主方神効

南星薑製 半夏薑製

瓜蒌仁 枳實煨炒

黃芩 黃連薑炒各錢

辰砂爲末五分

貝母 白茯苓去皮

石菖蒲 酸棗仁炒

天花粉 甘草少許

陳皮去白 白茯苓去皮

桔梗 山梔子

甘草三分 木香五分另煎

右劉一劑。生薑煎入竹瀝薑汁磨木香調辰砂末同服。

○一論癩屬氣血虛而兼痰火者。此攻補兼施平肝解鬱清火化痰除眩暈諸癩之症。

壽世保元

戊集五卷

清心抑膽湯

當歸酒洗

白芍酒炒

白朮去蘆炒

白茯苓去皮

陳皮去白

半夏薑汁炒

枳實炒

竹茹

石菖蒲

黃連薑炒

香附炒各一錢 麥門冬去心

川芎

人參

遠志去心

甘草各四分

右剉一劑生薑煎服。

○一論大人小兒忽然昏暈倒地五瀉之症。

朱砂

水飛用猪心一個割開入砂末五錢濕布包煨火炙熟取砂淨入後藥心與病人空心食之

巴豆仁

五錢石炭一碗炒紅入仁在內及冷取仁將灰又炒又以仁入內再取出用草帚拭去油灰不用

南星

沸湯浸三次剉姜製二兩全蝎去頭尾炙二錢

龍膽草二兩

右為末，適糊丸如梧桐子大，每服十五丸，薑湯送下。

○一論風瀉抽搐心志發狂棄衣而走登高而歌或數日不愈踰垣上屋

矣。言罵詈不避親疏，妄見鬼神，一切潮熱及風中厥逆牙關閉，立可過三聖散。

防風去蘆三兩 瓜蒂炒二兩

藜蘆去苗二兩 加減用或一兩或半兩或

右為粗末，每服五錢，用薑汁二盞煎，三沸，濾於大碗中，再用薑汁一盞，煎渣三沸，却入先前藥，同熬三沸，澄清候溫，徐徐投下，不必盡劑，吐如壓不止，煎葱白湯，噀三五口，立解。如不吐，再加服之。如服藥多，不出，涎再飲薑汁，鹽湯各一兩盞投之，如不出，以光紙喉中探引，即出矣。須用白盆一個，裏盆不見涎形狀，吐出青黃涎沫二三升，為効。吐後之後吃微溫白粥一二盞，此三聖散汗吐下三法俱行，防風發汗，瓜蒂下泄，藜蘆瀉吐，凡用法則禁忌症候小者勿服，病久雖合此勿服。吐後人勿服。主病不正勿服。泉口不能正勿服。先正病人心神清淨室中善侍病者，一二人溫克和柔，誘患人則妙矣。隄防止後致損，搗呼呌病人，諸狂必損，吐瀉罷可與米水及新水降心火，勿食熱物。

○一論諸風癱瘓不能言語怔忡健忘恍惚去來頭目眩暈胸中煩燥痰涎壅塞精神昏憤心氣不足神志不寧驚恐憂悸虛煩少睡或發癲狂小兒驚癇風搐大人暗風羊癲風癲發叫如雷其效如神

千金保命丹 侍御何中寔經驗。

朱砂二錢 珍珠一錢 瞻星三錢 甘草 麻黃去根節

白附子炮 雄黃 薄荷各一錢 防風 琥珀

金箔 牛黃各一錢 殭蠶炒 犀角鎊 麥門冬去心

枳殼去穰 桔梗去蘆 地骨皮 神曲炒 白茯苓去皮木

白朮去蘆 人參 遠志去心 柴胡各三錢 天麻二錢

膽礬分一錢七 冰片少許 黃芩七錢 麝香少許 紫河車七錢

天竺黃一錢 荆芥七錢 蟬退分一錢七 川芎 牙皂各一錢

右為細末煉蜜為丸如彈子大金箔為衣用蠟包裹用時取開每服二九薄荷煎湯磨化下不拘時服忌豬羊肉鯉魚核桃動風之物

○一參伯王措庵公事患癩七年。諸醫罔效。召余治。以追風祛痰丸安神丸二藥兼進。半載而愈。逾四年未發。復因不善保養。病如前。若復求余治。余以此方製藥一料投之。輒效。迄今數載不發。氣體已復原矣。暴辱公優渥。贈余扁曰。醫士無雙。余因此方屢驗。故更一字。名曰。醫癩無雙丸。

南星

半夏

二位用白礬皂角生薑煎湯浸一日夜透切片

隨湯煮乾去礬皂角不用

當歸身酒洗

懷生地黃酒洗

軟石膏

各一兩

天麻七錢

殭蠶

荆芥穗

川獨活

烏犀角

白茯苓去皮木

遠志

甘草水泡

麥門冬去心

酸棗仁炒

辰砂

棟參

白木去蘆油

陳皮去白

川黃連

去毛各五錢

白附子煨

真半黃

珍珠

川芎

黃芩

甘草各三錢

金箔三十片

右爲細末。好酒打稀糊爲丸。如梧桐子大。金箔爲衣。每服五十九。空心

白湯送下最能祛風化痰降火補氣養血理解寧心定志輕者半料奏效重者一料除根

○一兒十五歲御女後復勞役者試失意患癩症三年矣渴勞則發用十全大補湯加味歸脾湯之類更以紫河車生研如膏入蒸糯米飯為丸如梧子大每服百丸日三四服而痊後患遺精盜汗發熱仍用前藥及六味丸而愈此方治癩不拘老幼皆效

清心滾痰丸 治諸風癩癩有殊效方見癩狂

○一治驚癩方

白礬一兩半生半枯荆芥穗二兩

右為末麵糊為丸如黍米大朱砂為衣每服二十丸薑湯送下

健忘

夫健忘者陡然而忘其事也盡心力思量不來為事有始無終言談不知

首尾皆三於心脾二經蓋心之官則思脾之官亦主思此由心脾二經
傷於心則血結散神不守舍傷於脾則胃氣衰憊而慮愈深此二少皆心
入事則卒然而忘也蓋心生血因血少而不能養其真臟或節飲而氣
鬱以生痰氣既滯脾不得舒是病皆由此作治之必須養其心血理其
脾土凝神定智之劑以調理亦當以幽閑之處安樂之中使其絕於憂
慮遠其六慾七情如此日漸安矣

○一論思慮傷脾不能攝血致血妄行或吐或下或健忘怔忡驚悸不寐
發熱盜汗或心脾傷痛嗜臥少食大便不調或血虛發熱或肢體重痛
婦人月經不調赤白帶下或晡熱因熱致瘰癧流注不能消耗潰膿或
思慮傷脾而作瘧痢

歸脾湯 主方

黃芪 蜜炒

人參

白朮 去蘆

白茯苓 去皮 當歸 酒洗

遠志

甘草 木

龍眼肉

酸棗仁 炒

木香

甘草 炙

右劉蘊果加味歸脾湯○神不寧而健忘倍酸棗仁茯神當歸加柏子仁

○一論諸虛健忘及驚悸怔忡等症加減補心湯

人參 白朮 白茯苓 陳皮 當歸

白芍酒炒 生地黃 遠志指草木去心 石菖蒲 麥門冬去心

酸棗仁炒 黃柏酒炒 知母 甘草

右劉蘊果煎服

○一論寧心保神益血固精壯力強志令人不忘清三焦化痰涎祛煩燥
療咽乾除驚悸定怔忡育養心神大補元氣讀書勞神勤政勞心
天王補心丹 太中丞松石劉公傳加石菖蒲自部杜仲甘草

懷生地四兩 天門冬去心 麥門冬去心 當歸

柏子仁 酸棗仁炒 五味子各一兩 人參

遠志

甘草水

白茯苓 去皮

玄參

丹參

桔梗各五錢

一方加酒炒黃連二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大朱砂為衣每服二三十丸臨卧燈心

竹葉煎湯送下燈心煎湯亦可○如飲食不思大便不實恐不宜也又

當服後方

安神定智丸 功同補心丹

人參一兩五錢 白朮 去蘆炒

白茯苓 去皮

遠志 甘草水

石菖蒲 去毛

酸棗仁 炒

麥門冬 去心各

牛黃 另研一錢 辰砂 二錢 半水飛為衣

右為細末圓眼肉四兩熬膏和煉蜜三四兩為丸如梧桐子大辰砂為

衣每服三十丸清米湯下不拘時日三服。

○一論凡人多識不忘者心血足而無所蔽也若心血不足邪氣蔽之則

傷其虛靈之髓而學問易忘矣龍鱗蟲之靈物也龍鱗蟲之靈物也假

二物之靈以養心之靈欲其同氣相求云爾遠志辛溫味厚辛溫可使入心味厚可使養陰甘肅味辛氣溫味辛則利竅氣溫則通神以之而治易忘斯近理矣

聰明丸 泰元周用廷經驗。

敗龜甲 酥炙 龍骨入 雞腹中炙 遠志 去心苗

石菖蒲九節者各等分

右為末每服一錢酒調下日三服。

一論讀書辛苦而有房勞者

當歸 生地黃 白朮 玄參 各一錢川芎

白芍 白茯苓 黃柏 酒炒 知母 酒炒 麥門冬 去心

山梔 炒 甘草 各五分

右剉一劑生薑煎服。

一論顛狂健忘失志及恍惚驚怖入心神不守以多言不寤一切其氣

虛損用紫河車入補藥內服之。大能安神養血寧志。治健忘驚悸怔忡。不寐用六味丸加遠志石菖蒲入參白茯神當歸酸棗仁炒。
○一論諸虛健忘等症以十全大補湯去川芎黃芪肉桂加陳皮遠志石菖蒲麥門冬酸棗仁黃柏知母。

驚悸

○脈寸口脈動而弱。動為驚弱為悸。○心中驚悸脈必大結。飲食之悸沉伏

動滑。

夫驚悸即動悸也。動之為病惕然而驚。悸之為病心下怯怯。如人所捕。皆心虛膽怯之所致也。又曰驚者恐怖之謂。悸者在松之謂。在松健忘驚悸二症名異而病同。又云驚悸者。暴然而跳躍驚動。如有欲厥之狀。有時而作者。是也。屬血虛時覺心跳者。亦是血虛。蓋人之所主者心。心之所養者血。心血虛神氣不守。此驚悸之肇端也。

○一人聞聲即驚醫者令患人坐於堂上使兩人扶之醫自堂下以小菴木棰手擊而口云吾擊汝亦常事耳得何必驚且擊且言患者視之久而驚遂定此深得平治之法也。

○一論驚悸怔忡健忘不寐屬心血虛者

補心湯 主方

當歸一錢二分 川芎七分 白芍炒一錢 生地黃一錢二分

白茯苓一分 遠志去心八分 酸棗仁炒八分 麥門冬去心一錢

黃連錢 姜汁炒一白木去蘆一錢 玄參五分 甘草炙三分

右剉下剉水煎溫服。○一方加栝子仁

○一論血虛心神不安驚悸怔忡不寐並治

安神鎮驚丸

當歸酒洗 白芍酒炒 川芎七錢

白茯苓去皮木 貝母去心 遠志去心 生地黃酒洗 酸棗仁炒

生地黃酒洗 酸棗仁炒

麥門冬去心 黃連姜汁炒 陳皮去白 甘草三錢

朱砂研末水飛

右為末煉蜜為丸如菉豆大每服五十丸食遠棗湯送下

○一論七情六淫相感而心虛夜多夢寐睡臥不寧恍惚驚怖癢癢風心氣虛者

益氣安神湯

當歸二錢 黃連姜汁炒 生地黃 麥門冬去心

酸棗仁炒 遠志去心各一錢 白茯苓去皮心 人參

黃芪蜜炒 瞻星 淡竹葉各一錢 小草六分

右剉一剉薑一片棗一枚水煎服

○一論大人小兒被驚神不內守痰迷心竅恍惚健忘諸痢痲風心風

安神醒心丸

南星末五兩 川黃連木一兩五錢先以姜汁拌浸半日入南星末

人參五錢末一兩

製遠志五錢末一兩

飛過辰砂五錢研七錢

琥珀五錢

酸棗仁兩炒研末

右用雄猪心血三箇入竹瀝打麪糊為丸如梧桐子大金箔為衣每服五十丸食遠白湯送下小者二三十九

○一論異夢多驚有一法一於警中戴粗大靈砂一囊二於枕中置真解香一囊皆能杜絕異夢而除夜魔

○一論夜夢○陰盛夢大水恐懼○陽盛夢大火燔灼○陰陽俱盛則相殺○上感夢飛○下感夢墮○飽夢與人食○饑夢取人食○心實夢

燔灼○心虛夢救火陽物堅○肝虛夢細草芒芒○肝實夢伏樹下不敢起○脾虛夢飲食不足○脾實夢築室蓋屋○肺虛夢白物斷血籍

○肺實夢兵刃血戰○腎虛夢舟船溺水○腎實夢伏水中若有所畏

怔忡

夫怔忡者。心中不安。惕惕然如入將捕是也。屬血虛。有慮便動。屬虛。時作。怔忡者。因火動。瘦人多。是血少。肥人屬痰。怔忡者。心胸躁動。謂之怔忡。此心血不足也。多因富貴。戚戚貧賤。不遂所願而成。

○一論血虛火盛。怔忡心慌恍惚。煩燥不寧。
養血清心湯

當歸酒洗

川芎七分

白芍酒炒

生地黄酒洗

黃連姜汁炒

片苓去水

梔子炒八分

酸棗仁炒

遠志去心

麥門冬去心 各錢 甘草三分

右剉一劑 生薑煎服。

○一論心煩懊憹。驚悸怔忡。胸中氣亂。此血虛而火盛也。

朱砂安神丸

朱砂另研 五錢 當歸酒洗 二錢 生地黃酒洗 一錢 黃連酒洗 六錢

甘草五分二錢

一方加入參白朮茯神酸棗仁炒麥門冬去心各等分為末煉蜜為丸如黍米大每服五十丸食遠米酒送下

○一論思慮即心跳者是心中無氣少血故作怔忡也

四物安神湯

當歸酒洗

白芍酒炒

生地黄

酒洗熟地黄

人參

白朮去蘆

白茯苓去皮

酸棗仁炒

黃連姜炒

梔子炒

麥門冬去心竹茹

辰砂研末

烏梅一劑

右剉一劑煎服

○一論心氣怔忡而自活者不過一二服而愈

參歸腰子

人參五錢

當歸身

五錢猪腰子一對

右先以腰子用水二碗煮至一碗半將腰子細切入一味藥同煎至八

分吃腰子以藥汁送下如吃不盡腰子同上二味藥渣焙乾為細末山

藥糊為丸如梧子大每服三五十九米湯送下

○一論精神虛憊恍惚不寧心思昏憤氣不足健忘怔忡

加味寧志丸

人參

白茯苓去皮

遠志去心 神水泡 石菖蒲 米泔浸

酸棗仁炒

黃連去毛

栝子仁各一兩當歸酒洗

生地黄酒洗各錢 木香四錢

朱砂研水飛一兩二錢半一半入藥

右為細末煉蜜為丸如菉豆大半饑時麥門冬去心煎湯下五六十九

虛煩

夫虛煩者心胸煩擾而不寧也多是體虛者損養有乖第衛不調使人易
一氣有所偏勝也或陰虛而陽盛或陰盛而陽虛內經曰陽虛則外寒
陰虛則內熱陽盛則外熱陰盛則內寒令人虛煩多是陰虛生而熱力
致虛勞之人腎水有虧心火內蒸其煩必躁吐瀉之後津液枯竭煩而

有渴。惟傷寒及大病後虛煩之症，却無霍亂瀉病，宜審之。

巢氏病原曰：心煩不得眠者，心熱也。但虛煩不得眠者，猶冷也。

○一論病後虛煩不得眠，及心膽虛怯觸事易驚，短氣桂乏，或復自汗，

溫膽湯

半夏湯泡七錢

枳實炒各三錢

陳皮四錢半

白茯苓去二分半

甘草炙二分半

右剉分二劑，薑棗煎服。○丁方加酸棗仁炒，遠志去心，五味子熟地黃

人參各等分。

○一論大病後表裏俱虛，內無津液，煩渴心燥，及諸虛煩熱，與傷寒相似，

但不惡寒，身不痛，不可汗下，宜服。

竹葉石膏湯方見傷寒

不寐

不寐有二種有病後虛弱及年高入陽衰不寐者有痰在膽經神不守舍亦全不寐虛者用六君子湯加炒酸棗仁黃芪痰者用溫膽湯減竹茹一半加南星炒酸棗仁傷寒不寐者當求之本門

○一論心膽虛弱晝夜不眠百方無效服此如神

高枕無憂散

人參五錢

軟石膏三錢 陳皮

半夏姜炒

白茯苓去皮

枳實麩炒

竹茹

麥門冬去心 酸棗仁炒

甘草各一錢五分

右剉丁劑龍服五箇水煎服

○一論勤政勞心痰多少睡心神不足

養心湯

人參

麥門冬去心 黃蓮微炒

白茯苓去皮 白茯神去木

當歸酒洗

白芍酒炒 遠志去心

柏子仁 酸棗仁炒

陳皮

甘草

右剉蓮肉五箇去心水煎濕服
安神復睡湯

當歸

川芎

白芍 酒炒

熟地黄

益智仁

酸棗仁 炒

遠志 甘草水
泡去心 山藥

龍眼肉 各等分

右剉薑棗煎服。

○一論心氣不足恍惚多忘或勞心膽冷夜臥不睡此藥能安神定志
加味定志丸

人參 三兩

白茯神 去皮木 二兩

遠志 甘草水泡 去心一兩 石菖蒲 二兩

酸棗仁 炒 二兩

柏子仁 炒去殼 二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大聚砂乳香為衣每服五十九粒臥服
湯送下。

附睡法

睡不厭蹴覺不厭舒蹴者曲膝卷腹以左右肋側臥修養家所謂狎

子脈是也。如此則氣海深滿，丹田常暖，腎水易生，益入弘多，舒體而臥，則氣直而寢，神散而不潛，故臥惟覺時可舒體耳。○西山茶季通引千金方睡訣云：睡則必屈，覺正而伸，早晚以時，先睡心，後睡眼，晦菴以為此古今未發之妙。

○一論膽虛睡臥不安，心多驚悸，酸棗仁一兩炒令香熟。

右為末，每服二錢，不拘時，竹葉湯調下。

○一治心下怔忡，眠倒，即大聲打鼾，睡即醒，不寐，余用

羚羊角、烏犀角各用，水磨濃汁，入將所用，或養心湯，或復睡湯內服之，立效。蓋打鼾睡者，心肺之火也。

○一治膽虛常多畏恐，不能獨臥，如入捕狀，頭目不清。

人參

枳殼

五味子

桂心

甘菊花

白茯神

枸杞子

路三

山茱萸

五分

栝子仁

熟地黃

各一錢

右為末每服二錢溫酒調服

厥症

脉陽厥脉滑而沉實陰厥脉細而沉伏

氣虛則發厥血虛則發熱厥者手足冷也氣屬陽陽虛則陰寒之故發厥也血屬陰血虛則陽寒之故發熱也氣虛發厥者當用溫藥血虛發熱者不宜用涼藥當用溫養氣血之藥以補之宜養陰黃芪建中湯之類是也又有二種病實熱者極而手足厥冷所謂熱深厥亦深此當用涼藥須以脉別之此最難辨

- 一論陽厥者是熱深則厥深蓋陽極則發厥也急宜六一乙順氣湯治之
- 一論陰厥者始得之身冷脉沉四肢厥逆足膝臥唇舌青或自利不渴小便色白宜四逆理中湯之類仍速灸關元百壯鼻尖有汗為度
- 一論痲厥者卒然不省人事喉中有水雞聲者是也用牙皂白礬等分

研末吹鼻。即以香油一盞入薑汁少許灌之。立醒。或燒竹瀝薑汁灌之亦可。

○一論蛇厥者。乃胃寒所致。經曰。蛇者長蟲也。胃中冷。即吐蛇。宜理中湯。加炒川椒五粒。檳榔五分。吞烏梅丸。

○一論氣厥者。與中風相似。但風中身溫。氣中身冷。以藿香正氣散加南星木香烏藥。如有痰。以四七導痰湯主之。

○一論暴怒暴死者。名曰氣厥。蓋怒則氣生。氣上則上焦氣實而不行。下焦氣逆而不吸。故令暴死。氣上宜降之。

五磨飲子

木香

沉香

檳榔

枳實

白烏藥

右五件等分。白酒磨服。立醒。

黃芪建中湯見汗証。六一順氣湯見傷寒。四逆湯見中寒。理中湯見中寒。藿香正氣散見霍亂。四七湯見諸氣。導痰湯見痰飲。

心胃痛

(脉)沉細而遲者易治。浮大弦長者難治。

胃脘痛者多因縱恣口腹喜好辛酸恣飲熱酒煎博復食寒涼生冷朝傷暮損日積月深自鬱成積自積成痰痰火煎熬血亦妄行痰血相雜妨碍升降故胃脘疼痛吞酸噎氣體積痞心皆腸胃反胃之漸者也。俗醫以燥熱之藥治之以火濟火悞矣。古方有九種心痛曰飲曰食曰風曰冷曰熱曰悸曰蟲曰疰曰去來痛夫所謂冷者惟一耳豈可例以熱藥治之乎。須分新久若明知身犯寒氣口得寒物而病於初得之時當用溫散溫利之藥若病久則成鬱矣鬱則成熱宜用炒山梔為君熱藥為之嚮導則邪易伏病易退病安之後若縱恣不改病必再作難治矣。此病雖可久不食不死必須待服藥數劑痛定過一二日漸而少食方得痊安。其有真心痛者大寒觸犯心君又曰活血衝心手足青過節者巨發

夕死夕發且死非藥所能療焉

○一論胃脘積有鬱熱刺痛不可忍著此方治心胃痛之主方也

清熱解鬱湯

山梔仁炒二錢

枳殼去穢五分炒川芎一錢

黃連炒一錢

陳皮五分

乾薑炒五分

蒼朮米泔浸七分

香附炒一錢

甘草三分

右剉丁劑生薑三片水煎熱服服後戒飲食太半日再服丁劑神效如痛甚加薑汁二三匙入藥同服

○一論諸積氣為痛心膈痛腹痛血痛腎氣痛脇下痛大便不通乳壅宿食不消等症

神保丸

木香二錢半

胡椒二錢半

全蝎全者七枚

巴豆心枚去皮

右為末入巴豆霜再研湯浸蒸餅為丸如麻子大朱砂三錢為衣每服

三七粒。○心膈痛。枯蒂煨心湯下。○腹痛。枯蒂煨薑煎湯下。○血黃痛。炒薑醋湯下。○肺氣盛者。白礬粉各一錢。黃丹一錢。同研為散。煎茶白皮糯米飲調三錢下。○氣喘。桑白皮糯米飲下。○腎氣痛。脇下煎炒茴香酒下。○木便不通。蜜調檳榔末一錢下。○氣噎。木香湯下。○宿食不消。茶下。或酒漿飲任下。○酒麪熱毒過度。療飲致臂痛。柿蒂湯下。○諸氣惟膀胱氣。脇下痛最難治。獨此藥能去之。○有人病項筋痛。諸醫皆以為風治之。數月不瘥。乃流入背脊。久之。又注右脇。變痛甚苦。乃令服之。一投而瘥。再服除根。

清上飲

○一論治心胃刺痛。并兩脇肋痛。嘔吐胸痞。大便堅。六脉數。或發熱口乾。

- | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 甘草 | 鬱金 | 柴胡 | 黃芩 | 赤芍 | 厚朴 | 枳實 | 梔子 |
| | 黃連 | | | | | | |
| | 半夏 | | | | | | |
| | 青皮 | | | | | | |
| | 大黃 | | | | | | |
| | 芒硝 | | | | | | |

右劉生薑三片水煎熱服

○一治心氣及胃脘諸痛鬱火所致者

肥梔子

去壳汁炒

撫芎一錢

香附童便炒

右劉米煎三滾入薑汁三四匙再煎一滾去渣入百草霜二匙調和服

○一治心胃痛不可忍者或心神恍惚

梔子炒黃連炒二味倍用茯苓茯神減半水煎服立止

○一治因食多煎炒燒餅米拌熟麵之類以致熱鬱胃脘當心而痛以嘔

吐不已漸成蓄胃

黃連

六錢

甘草

一錢

右劉水煎溫服立止

○一治胃脘心氣作痛有熱者

酒餅炒

梔子炒

石膏煨各三錢

右劉水煎下服立止

壽世保元

戊集五卷

二十六

一論男婦小兒常憤心腹作痛宜服此一料以拔病根永不再發此藥能清痰涎消食積酒積茶積肉積一切諸積在胃脘當心而痛及痞滿惡心嘔雜噯氣嘔吐吞酸脾疼諸痛神效

無價金丹

白朮 去蘆炒 三兩

枳實 炒

蒼朮 米泔浸炒

猪苓

麥芽 炒

神麩 炒

半夏 湯泡各一兩

澤瀉

赤茯苓 去皮

川芎

黃連 陳土炒

白螺蛸 殼 煅各七錢

砂仁

草豆蔻

黃芩 陳土炒

青皮 去穰

萊菔子 炒

乾生薑 各五錢

陳皮 去白

香附子 童便炒

瓜蒌仁

川厚朴 去皮 姜炒

檳榔 各三錢

木香

甘草 各二錢

右爲細末青荷葉泡湯浸晚粳米研粉作糊爲丸如梧桐子大每服七十九多至百丸米湯送下吞酸加吳茱萸湯泡寒丸用五錢熱月用

二錢半。久病挾虛加入參扁豆石蓮肉各五錢。時常口吐清液加炒滑石一兩牡礪煨五錢。

○一論胃脘痛屬寒者

下胡三建湯

丁香 良薑 官桂 各一錢五分

右剉一劑水一碗煎七分用胡椒五十粒炒為末調入藥內頓服。上方用良薑末三分米湯調下立止。

○一治心胃刺痛不可忍屬胃口冷氣所致者

乾薑炒 官桂 蒼朮米泔浸炒 半夏姜汁炒

右剉生薑煎服

○一論一切氣痛心痛肚疼及冷氣痛

良薑一兩 吳茱萸炒 胡椒一兩

右為末每服五分輕者三分用飛過盤三分溫酒調服

壽世保元

良薑五錢

○一論氣自腰腹間攻心痛不可忍腹中冰冷自汗如洗手足變紫厥冷
山梔子太若四十箇連皮搗碎炒黑 大附子丁枚洗去皮臍
右為粗末每服二三錢酒煎八分入鹽丁拾溫服
○一治諸般心腹氣痛或瘀血作痛

樵靈丹

梔仁五錢 五靈旨五錢火煨裂

右為末醋糊為丸如梧子大每服二十丸酒下或醋湯下

○一人心胃刺痛手足稍冷出汗指甲青百藥不効余用當歸三錢煎湯外用水磨木香沉香烏藥枳殼磨濃調服立止

○一論寒邪冷氣入乘心絡或臟腑暴感風寒上乘於心令人卒然心痛或引背脊甚則經年不瘥

桂附丸 西園公屢驗

川烏頭炮去皮附子三兩 乾薑炮二兩 官桂二兩

川椒去日殺炒赤石脂二兩

右為細末，以蜜為丸，如梧子大，每服三十丸，溫水下，覺至痛處即止，不止，加至五十丸，以知為度。若早朝服，無所覺，至午後，再進二十丸，若久，心痛，每服三十丸，至五十丸，盡一劑，終身不發，治心膈微痛，如神。

○一論：心腹疼痛，無作必胸滿嘔吐，厥冷面赤唇麻，咽乾口燥，寒熱不時，而脈洪大，屢服寒涼，損真之故。內真寒而外假熱也。且脈弦洪而有怪狀，乃脾氣虧損，肝脈乘之，而然當暖補其真。

補中益氣湯方見前傷依本方加半夏茯苓吳茱萸

○一婦人胃院常心而痛，刺右寸關俱無，左雖有微而似絕，手足厥冷，病勢危篤，察其色，眼胞上下青黯，此脾虛肝木所勝，身發大熱，其脈沉而草補其中氣，用木香和胃，以行肝氣，用吳茱萸散脾胃之寒，以止痛，急與一劑，俟涼，先服煎藥，再進諸病悉愈，何使泥其痛無痛去而反用攻伐之藥，禍不旋踵。

一婦人懷抱鬱結不時心腹作痛年久不愈諸藥不應余用歸脾加妙
山薑而愈

一唐儀部胸內作痛月餘腹亦麻左關弦長右關弦緊此脾虛肝邪所
乘以補中益氣加半夏木香二劑而愈又用六君子湯二劑而安此而
色黃中見青

一論名蟲者必面上白斑唇紅又痛後便能食時作時止者是也月
陳湯加苦練根皮煎服上半月蟲頭向上易治下半月蟲頭向下難治
或曰痛而久臥不安自按心腹時大牛或青或黃唇緩目無睛光者此
蟲痛也

一治蛔蟲作痛神方

用苦練根上及洗淨白水煎露下宿次日早燒猪肉下塊吹其氣然
後服藥其法上半月服此蟲盡下

一治寸白蟲作痛

用酸石榴東南根二兩檳榔五錢太黃五錢白水煎露一宿次日五
更冷服未服先燒此猪肉與其氣不可食其藥上半月服之立効

烏梅丸

當歸四錢 人參六錢 炮薑一兩 肉桂六錢 大附子六錢

川椒去目四錢 細辛六錢 黃連一兩六錢 蜀椒六錢 枳實六錢

右為細末烏梅三十箇去核搗爛入蜜為丸如梧子大每服五十九
穿心鹽湯送下烏梅用好醋漬一宿去核於五升米飯上蒸熟如泥
和藥令相得納白中杵三千下入竈和丸又治胃膈發咳而嘔吐
則長蟲出

○一論蠱攻心痛并腹中有塊按之不見往來痛無休止
化蠱丸

鶴虱三錢 胡粉炒 白礬枯 苦練根皮 去淨皮

檳榔各五錢

右為末麩糊為丸如梧桐子大每服十五丸米飲入真麩麻油一二點打勻服之其蟲小者化為水大者其下

○一婦人年四旬心胃刺痛時痛時止不思飲食食則即吐手足厥冷胸中痞悶口乾作渴余曰此胃中有蟲也以二陳湯加檳榔枳實烏梅花椒炒黑熟薑苦楝根皮生薑煎一服打下蟲一大碗遂止

○一論急心痛

玄靈散

五靈脂去砂石 玄胡索炒

莪朮火煨

良薑炒

當歸各等分

右為末每服二錢熱醋湯調下

○一論諸心氣痛不可忍

終雪散

白礬 枯 兩 朱砂 一錢 金箔 三片

右為末，每服一錢五分。輕者一錢。空心白湯調下。

一論心疼方

白礬 枯 一兩 白礬砂 一錢五分

右為細末，薑汁打麩糊為丸。如黃豆大，每服一丸，溫酒送下。

一論心胃氣痛如神

用生礬 枯礬 等分 為末 麩糊 丸 如櫻桃大 每服三丸 燒酒送下 立止

一治心胃刺痛 黑砂糖半 錘熱燒酒調服

一治心氣痛 五靈脂一錢 枯礬二分 為末 溫酒調下

一治心胃痛至死 用良薑末三分 米湯調下 立止

一徐四可治胃脘痛 用炒鹽一錢 生薑七片 水煎一鍾 溫服立止

一論心腹痛 不問寒熱 新久一服立止

官桂 一錢五分 白芍 二錢 酒炒 甘草 五分

右剉水煎服。○如感冒寒邪加香蘇散有熱加黃連。○如太便秘及下痢初起任服涼藥不過腹痛不止加大黃根設立効。

○一治胃脘痛甚諸藥不効者

黃連 六錢 大附子 炮去皮臍 一錢

右剉丁剉生薑三片棗一枚水煎稍熱服。

○一治心疼黃荆子炒焦爲末米飲調下。

又方蜜一小鐘酒一碗同蜜煎滾調枯礬末一錢溫服出汗。

○一治諸血諸氣痛不可忍及心脾氣血諸痛又治血滯腰痛。

三香沉麝丸 內附蘇沈方

朱砂 沒藥 各一分 沉香 一分 木香 半分

麝香 半分

右生薑末磁器煮生甘草膏丸如皂角子大每服一丸薑盞溫酒下。婦人產後血氣痛並主之亦治脚痛血滯腰痛用續斷牛膝樅仁炒煎。

湯磨下血暈用乳香泡湯研化服

腹痛

脈心腹痛不得息脈細小遲者生脈大而疾者死

夫腹痛者有寒氣客於中焦于於脾胃而痛者有宿積滯於腸胃結滯不散而痛者有痛而嘔者有痛而泄者有痛而大便不通者有熱者有虛痛者有實痛者有濕痰痛者有死血痛者有蟲痛者種種不同治之皆當辨其寒熱虛實隨其所得之証施治若外邪者散之內積者逐之寒者溫之熱者清之虛則補之實則瀉之泄則調之閉則通之血則消之氣則順之蟲則追之積則削之加以健理脾胃調養氣血斯治之也

○一論風寒外感飲食內傷七情惱怒過度肚腹疼痛初起者行氣香蘇散方見飲食

○一論外中寒邪內傷冷物肚腹綿綿痛不已而手足厥冷者

五積散方見中寒

○一論肚腹疼痛有寒有熱有食有氣治一切肚腹痛之總首也

開錢道氣湯

蒼木米泔浸一錢

陳皮五分

香附童便浸一錢

白芷一錢

川芎一錢

白茯苓去皮一錢

乾薑炒五分

滑石一錢

山梔仁炒二錢

神麴炒一錢

甘草少許

右對一剗水煎溫服

○一論綿綿痛無增減脉沉遲者寒痛也

薑桂湯

乾薑

肉桂

良薑各七分

枳殼去穢炒

陳皮

砂仁

厚朴姜汁炒

吳茱萸炒各一錢

香附一錢五分

甘草三分

右剗生薑煎服○痛不止加玄胡索茴香乳香○六極手足冷加附子

去吳茱萸良薑○泄瀉去枳殼

○一論作痛乍止脉數者水瀉也

散火湯

黃連炒

白芍炒

梔子炒

枳殼去穢

厚朴去皮

香附

樛芎各一錢 木香

砂仁

茴香各五分

甘草三分

右剉一劑生薑一片水煎痛甚不止加大玄胡索

○一論肚腹滿硬痛久不止大便實脉數煩渴者積熱也

枳實大黃湯

枳實

大黃

檳榔

川厚朴錄二 甘草三分

木香 五分另研

右剉一劑水煎溫服

○一論痛不移處者是死血也

活血湯

當歸尾

赤芍

枳仁

去皮尖

牡丹皮

玄胡索

烏藥

香附子

枳殼

去穢各

紅花

官桂 各五分

木香

磨粉另川芎七分

甘草二分

右剉一劑生薑二片水煎服。

○一論小便不利而痛腹中鈞引脇下有聲者是濕痰也。

二陳湯加減方見痰飲

○一論以手按之腹軟痛止者是虛滿也。

溫中湯

良薑

官桂

益智仁

砂仁

木香 另研

香附米

厚朴 姜炒

陳皮

小茴香

酒炒當歸

玄胡索

甘草 各等分

右剉一劑生薑煎服。

○一論食積腹痛其脈弦其痛在上以手重按愈痛甚欲大便利後其痛減者是也

加味平胃散

蒼朮米泔浸炒 陳皮 一錢

川芎 五分 香附 一錢

神麩炒 二錢 山楂 一錢

厚朴姜炒 八分

枳實熱炒 一錢

乾薑 七分

半夏姜炒 三分

木香 三分

甘草 三分

右剉丁劑。生薑三片。水煎溫服。

○一論時痛時止面白唇紅者是蟲痛也。

椒梅湯

烏梅

花椒

檳榔

枳實

木香

香附

砂仁

川練子去核

肉桂

厚朴去皮

乾薑

甘草炙各

右剉丁劑。生薑三片。水煎服。

三仙丸 治蠱痛

雄黃

白礬

檳榔各等分

右為米飯丸如黍米大每服五分食遠白水下。○乾痛者不吐不泄而但痛也有時者淡食而饑則病厚味而飽則否也。○經曰腹疾乾痛有時當益蟲此之謂也。

○一孩子腹中作痛看至死腹中揣摸似有大小塊諸醫不效子只令人慢慢以手搓揉痛處半日其蟲自大便出而愈。

○一婦人腹痛如錐刺每痛至死不敢着草木麻洪數此腸癰毒也。

用穿山甲炒白芷貝母殭蚕大黃谷下太劑水煎服打膿血自小便中出即愈。

○一李儀部常患腹痛治以補中益氣加炒山梔即愈。

○一朱太守因怒腹痛作瀉或兩脇作脹或胸乳作痛或寒熱往來或小便不利飲食不入嘔吐痰涎神思不清此肝木乘脾土用赤柴胡加山

梔炮薑茯苓陳皮製黃連丁劑即愈製黃連即黃連吳茱萸等分用熱水拌溫器一二日同炒焦反煎

○丁人內停飲食外感風寒頭疼發熱惡心腹痛于以藿香正氣散加香

附川芎二服而止次日煎酒悉除惟腹痛不止以手重按其痛稍止此

客寒乘虛而作也以香砂六君加木香炮薑服之睡覺痛減六七去二

香再服即愈

○一婦人臍腹疼痛不省人事只此一服立止人不知者云是心氣痛誤

矣于用白芍五靈脂木通去皮三味等分每服五錢醋水各半煮煎至

七分去渣溫服

○一論白芍藥味酸微寒補中焦之藥得多甘草為輔治腹中痛之聖藥

也○如夏中熱腹痛少加黃芩○若惡寒腹痛只少加肉桂一錢白芍

三錢甘草一錢五分此三味為治寒腹痛此仲景神品藥也○如深秋

腹痛更加桂二錢○如冬月太寒腹中冷痛加桂枝二錢五分水二盞

煎服

腰痛

丹溪曰脉必沉而弦沉盛滿弦為濕滯者是瘀血緩者是濕滯者伏者是痰大者是腎虛也

夫腰乃腎之府動搖不能腎將痿矣多因嗜慾無節勞傷腎經有為熱由憂思風寒濕毒傷之遂至腰痛或引於脊項及下脇下不可俯仰皆由腎氣虛弱所致宜滋腎調氣病可除矣

○一論常帶腰痛者腎虛也此方主之

補腎湯

當歸酒洗

白芍酒炒

生地黄

熟地黄

陳皮

小茴益酒炒

破故布酒炒

牛膝去蘆酒洗

杜仲酒洗粗皮

白茯苓去皮各人參五分

黃酒去皮酒炒

知母酒炒各七分

甘草炙三分

右剉丁剉棗二枚水煎服。○痛甚者加乳香砂仁沉香去芳乳生地陳皮。○如常服合丸藥俱為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九丸湯下酒亦可。

○一論腰膝濕熱作痛者

清熱勝濕湯

蒼朮米泔製

黃柏鹽水炒

羌活

白芍酒炒

陳皮去白

牛膝去蘆酒洗

木瓜

杜仲姜汁炒

威靈仙

澤瀉各五分

甘草三分

右剉生薑三片水煎服。○痛甚者加乳香沒藥為末各五分。○水濕停下入黑丑檳榔各五分。○血痛加歸尾桃仁去皮尖各一錢紅花酒洗五分。○倦怠脚如沙隆加蒼朮防已蒼朮仁白朮各五分。○冷風作痛加熟附子一錢虎脰骨末五分去黃柏澤瀉各三分。○游走而痛加紫金皮川烏。○濕熱加炒梔子。○氣不順加烏藥。○酸軟加牛膝當歸地

黃○腎虛加破故昏炒五分

○一論氣滯腰痛并閉挫腰痛腎虛腰痛

立安散

當歸酒洗

官桂

玄胡索炒

杜仲去皮

小茴香酒炒各木香三錢

黑丑一兩半生半熟

右為細末每服二匙空心溫酒調下。丁方去黑丑以酒煎服。

○一論腰痛神方

魚鱗炒成珠好酒一碗淬入內溫熱過口連渣服。

○一論此方專滋腎水壯元陽益筋骨又能烏髮治腎虛腰痛足膝病

青娥丸

破故昏酒炒

川草薢重便浸杜仲姜汁炒

牛膝去蘆

黃栢鹽水炒

知母酒炒各

胡桃肉去皮泡

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服八十九空心酒送下

○一論腎氣虛弱肝脾之氣襲之令人腰膝作痛屈伸不健冷痺無力夫腎水藏也虛則肝脾之氣乘之故令腰膝作痛而作痛屈伸不健者筋骨俱病也經曰能屈而不能伸者病在筋能伸而不能屈者病在骨故知骨伸不健為筋骨之病也冷痺者陰邪實也無力者氣血虛也獨活寄生湯方見中濕

○一論元氣虛弱腰痛白濁以

補中益氣湯方見內傷依本方加黃柏知母白芍俱酒炒牛膝去蘆酒洗

杜仲薑酒炒

○一論腎經虛損腰腿遍身疼痛

壯腎散 扶溝何睛散

仙靈脾 酒浸 五兩

遠志 味心 五兩

巴戟 去心 六兩

杜仲 酒炒 五兩

破故帛 酒炒 五兩

肉苁蓉 酒破 六兩

青鹽 八兩

大茴香 五兩

小茴香 炒 五兩

右為末每服二錢用猪腰切開搽藥末在內盛裏火煨熟細嚼酒下

○一論腰痛人皆作腎虛治諸藥不効者此瘀血痛也
太黃半兩更入生薑半兩同切如小豆大於鍋內炒黃色投水二碗煎五更初頓服天明取下腰間瘀血物用盆器盛如雞肝樣痛即止

○一治腰痛不能轉側點藥後少頃復舊神妙

雄黃二錢 黃丹一錢 酸硝三錢 去黃丹名火龍片

右為細末令患人仰睡以銀簪蘸藥點取木角頭少許工二次神効
天月德日合忌雞犬等見之

○一治腰痛良方

杜仲姜酒炒 破故布炒五分 小茴香鹽酒炒 人參三分

右為末用猪腰子二箇切開入藥蒸熟帶水渣同食即愈

○一治腰痛秘方 王景明傳

當歸酒洗 杜仲酒炒 大茴香 小茴香同炒 羌活

獨活

右剉丁大劑用頭生酒浸丁宿次早瀝汁溫熱服之用渣將酒再煎溫服立效

補遺

青娥丸 馬伏所秘傳

治諸虛百病大補之聖藥也素患腰痛者殊效

仙茅四兩酒浸洗

白茯苓四兩

川杜仲去皮切

川革薺四兩酒浸洗

破故布四兩酒浸

懷生地黃酒浸砂鍋內

懷熟地黃酒洗淨

當歸酒洗

巴戟心四兩

青鹽四兩水洗去

天門冬去心

揀參二兩

鬼絲子酒浸

肉苁蓉酒洗去鱗

小茴香酒炒

瑣陽三兩

黃精酒蒸四兩

甘枸杞子四兩

牛膝去蘆酒洗

鹿茸酥炙四兩

核桃肉去殼一百五十箇搗如泥

右為細末好酒打糊為丸如梧子大每服百丸空心鹽湯好酒任下忌
三五

○一治一切腰痛如神 宋東園傳

黑丑半生半炒為頭末水和丸如梧子大硫黃末為衣每服五十九
空心鹽湯送下

脇痛

脈雙弦者肝氣有餘兩脇作痛

夫脇痛者厥陰肝經為病也其症自兩脇下痛引小腹亦當視內外所感
之邪而治之若因暴怒傷筋悲哀氣結飲食過度冷熱失調顛仆傷
或痰積流注於脇與血相搏皆能為痛此內因也若傷寒少陽耳痛
痛風寒所襲而為脇痛此外因也治之當以散結順氣化痰和血為主
平其肝而導其滯則無不愈矣

○一論左脇下痛，肝積屬血，或因怒氣所傷，或跌撲閃挫所致，而為痛也。
疎肝飲 主方

黃連吳茱萸煎柴胡

當歸酒洗青皮去穢

枳仁研如泥

枳殼炒各

川芎

白芍酒炒各

紅花五分

右剉一劑，水煎，食遠服。

○一論右脇痛者，肝邪入肺也。

推氣散 治肝邪入肺，右脇痛甚，脹滿不食。

片薑黃

枳殼炒各 桂心少許

甘草炙五分

一方加

陳皮一錢五分半夏薑炒一錢

右剉一劑，生薑三片，水煎，食遠服。

○一論左右脇俱痛，肝火盛而木氣實也。

柴胡芍歸湯

柴胡

川芎

白芍

青皮

枳殼

香附子

當歸

龍膽草

木香

砂仁

甘草各等分

右剉一劑置一片水煎溫服。

○一論因內有濕熱兩脇痛甚伐肝木之氣瀉肝火之要藥也。

當歸龍薈丸

當歸

龍膽草

山梔子

黃連

大黃

蘆薈

青黛各五錢

木香

五分

麝香

五分

加柴胡

五錢

青皮

去穢炒一兩

右為細末神麩打糊為丸如梧桐子大每服二十丸薑湯送下。

○一論勞傷身熱脇痛者脈必虛也。

補中益氣湯方見內傷。此方加川芎白芍青皮木香砂仁小荷枳殼法。

黃芪白朮升麻

○一論左脇下有塊作痛不移者是死血也

活血湯方見腹痛依本方加青皮去烏藥

○一論男子房勞兼怒風府脹悶兩脇脹痛此色慾損腎怒氣傷肝

六味地黄丸料加柴胡當歸二劑而安方見補益

○一婦人口苦脇脹此肝火也用小柴胡湯加黃連梔子少愈更以四君

子湯加當歸白芍柴胡調脾胃而瘥

臂痛

臂為風寒濕所搏或睡後手在被外為寒邪所襲遂令臂痛及乳婦以臂

枕兒傷於風寒而致臂痛者悉依後方對症用之

○一論有因濕痰橫行經絡而作臂痛者

一木湯

蒼朮米泔浸白朮去蘆

南星

陳皮

白茯苓去皮

香附

酒炙

羌活

威靈仙

半夏

甘草各一錢

右剉一剉生薑煎服。

○一論臂痛因于寒者

五積散方見中寒

○一論臂痛因于氣者

烏藥順氣散方見中風

○一論臂痛因于濕者

觸澤湯

當歸

赤芍

黃芪

羌活

薑黃

防風

甘草各等分

右剉生薑五片煎服。

○一論臂冷痛起于其寒或一臂痛或兩臂俱痛者

五積交加散 葉圭簿得効

五積散合入參敗毒散加木瓜薑棗煎服未効再加牛膝末効可服
烏藥順氣散加羌活木瓜

○一論凡臂軟無力不在重者乃肝腎氣虛風邪客滯於榮衛之間使
血不能周養四肢故有此症肝主項背與臂膊腎上腰膝與脚膝其二
臟若偏虛則隨其所主而病焉今此症乃肝氣偏虛宜補肝腎六味丸
去之

○一男子年六十餘素善飲兩臂作痛恪服祛風治痿之藥更加麻木發
熱體軟痰湧腿膝拘痛口噤語澀頭目暈重口角流涎身如蟻行按起
白屑始信謂余曰何也余曰臂麻體軟脾無用也痿涎自出脾不能攝
也口斜語澀脾氣傷也頭目暈重脾氣不能升也痒起白屑脾氣不能
營也遂用補中益氣加神效半夏茯苓三十餘劑諸症悉退又月來未
煎膏治之而愈

肩背月痛

○一論脈洪而大脈促上緊者有直痛沉而滑者有痰痛也
證痰湯

半夏製

梔子炒

陳皮

海桐皮

枳殼各八分

桔梗

赤芍

蒼朮製

香附各七分
茯苓六分

川芎

薑黃各五分
甘草二分

右剉一劑生薑煎服如痛甚頭刺加朴硝二錢

○一論肩背痛不可回顧者太陽氣鬱而不行也以風藥散之脊痛腰強
腠似折項似援此足太陽經不運行以

羌活勝濕湯

藁本一錢

防風一錢

羌活

獨活各二錢
川芎一錢

蔓荊子六分
甘草六分

右劉子劑水煎服。○身痛腰沉經中有濕寒加防已一錢輕者炮附子重者炮川烏各五分。

○一論背心一點痛者痰氣之所聚也。

參合湯

陳皮

半夏

茯苓去皮

烏藥

枳殼麩炒

殭蠶炒

川芎

白芷

麻黃

桔梗

訶藟

紫蘇

香附

蒼朮

羌活各等分

甘草減半

右劉蕡聚煎服

○一論風熱乘肺肩背強直作痛

提肩散

防風

羌活

藥本

川芎

白芍炒各七分

黃連酒炒

黃芩酒炒各五分

甘草四分

右劉下刺生薑三片煎服。○濕加蒼朮防已薏苡仁各五分。○氣虛加人參。○汗多加黃芪蜜炒下錢。○血虛加芎歸地黃。

○一治肩背痛汗出小使數而少風熱乘肺肺氣鬱也。當瀉風熱則始通氣防風湯。

防風

羌活

陳皮

人參

甘草

各五分

藁本

青皮

白豆蔻

黃柏

各二分升麻

柴胡

黃芪

各一錢

右作一劑水煎食後溫服。○如面白脫色氣短者不可服。

○一論體虛人背上惡風或夏月怕脫衣及婦人產後被冷風吹入經絡。故常冷痛或手足冷至骨者。又治腰痛及一切冷痺痛。又治濕氣。

禦寒膏

用生薑八兩取自然汁入牛膠三兩乳香沒藥末各下錢五分。○內煎化就移在滾水內頓以柅條攪至成膏。又入花椒末少許再攪。

勻用皮者將搗作殼子看痛處潤狹貼患處用鞋熱烘熨之候五六日脫下或起小痕不効

痛風

夫痛風者皆因氣體虛弱調理失宜受風寒暑濕之毒而四肢之內肉色不變其病晝靜夜劇其痛如創者為寒多腫滿如刺者為濕多或汗出入水遂成斯疾久而不愈令人骨節蹉跌肢脛消瘦者為難療矣考痛風脉理多端有且定而夜甚脉弦而緊者是痛風也脉沉而伏中氣也不可一例而治臨症當審辨矣

經曰痺者謂風寒濕三氣合而成痺故曰痛痺筋骨掣痛也曰者痺甚而不行也曰行痺走痛不定也曰周痺周身疼痛也皆邪氣有餘之候耳○一論痛風腰背手足肢節疼痛乃血虛氣弱經絡枯澀寒濕滯於下後夜甚者血弱陰虛午前早上其者氣滯陽弱痛止者乃曰痛風

風走注風膝大脛瘦曰鶴膝風是也

參五秦光湯

當歸二錢

芎藭七分

赤芍酒炒七分

生地黄酒浸一錢

秦光去虛一錢五分

蒼朮童便浸一錢

羌活一錢五分

川獨活一錢

草薺一錢

五加皮二錢

黑狗脊去根二錢

黃連姜汁炒二錢

黃柏酒炒一錢

黃芩酒炒一錢五分

紅花酒洗八分

黃芪酒炒二錢

人參二錢

牛膝去蘆酒浸一錢五分

杜仲每一錢水三鍾并炒二錢

生甘草三分

右剉，槐枝七根，每長一寸半，燈心七根，水煎，臨服入童便，好酒各一盞，空心溫服，渣再煎服。忌酒、麪、鯉魚、濕熱、羊鵝。○如天將作雨，陰陽時白，而預先覺痛甚者，加防風、天麻、升麻。○午後夜甚者，血弱陰虛，加升麻五分、牡丹皮一錢。○早上午甚者，氣滯陽弱，加連翹、沉香、竹瀝、乳汁。○痛甚者，倍羌活、紅花、酒炒、連翹、涼血，則痛止。○此症乃筋與骨症，幼

者乃外淫侵入木人及年近老者不善養而得蓋筋屬肝血骨屬腎水內損所致耳

○一論濕熱作痛不拘上下用之蒼朮妙于燥濕黃柏妙于去熱二物皆有雄壯之性亦簡易之方也加牛膝則治濕熱下流兩脚麻木或如火燎之熱者

二妙散

蒼朮 未泔浸 黃柏 乳汁潤透

右為末每服三錢用酒調下痛甚加生薑汁熱服

○一論血脉凝滯筋絡拘攣肢節疼痛行步艱難活血理氣第一品也舒筋散

玄胡索 炒 當歸 辣桂 各等分

右為末每服二錢酒調下玄胡索活血除風理氣

十全大補湯 治勞倦遍身疼痛加半夏摻製使桂

○一婦人年七十條 遍身作痛 筋骨尤甚 不能伸屈 遍身作痒 如蟲行 口乾目赤 頭暈痰壅 胸膈不利 小便短赤 夜間殊甚 用六味地黃丸 加山梔柴胡 水煎服。

○一論 瘀血濕痰 著于肢節之間 筋骨之會 空竅之所 而作痛也 肢節沉重者 是濕痰 晚間病重者 是瘀血也

趕痛湯

乳香 沒藥 地龍 酒炒 香附 童便浸 桃仁

紅花 甘草節 牛膝 酒浸 當歸 羌活

五靈脂 酒淘去土

右剉水煎 溫服

○一論 寒濕之氣 痺滯關節 麻木疼痛

續斷丸

黃芪 一兩 人參 七錢 白朮 七錢 白茯苓 兩 熟地黃 二兩

山藥一兩

山茱萸肉

牡丹皮一兩

慧苡仁一兩

續斷一兩

麥門冬一兩

石斛一兩

防風七錢

桂心一兩

鹿角膠

右為細末，煉蜜為丸。如梧桐子大，每服五十丸，空心溫酒下。

○一論：人手足不能屈伸，遍身疼痛。

消風飲 臨川徐堪鴻試驗

陳皮

白朮

去蘆

當歸 酒洗

白茯苓

去皮

玄胡索

半夏

姜製

牛膝

去蘆

川芎 各八分

防已

羌活

獨活

秦艽

各六分

枳殼 去穢

防風 各五分

木瓜 四分

甘草三分

右剉，下劑生薑煎，不拘時服。○氣虛加人參八分。

○一論：一切遍身骨節疼痛，或流注作痛，不可忍，者，此藥效。

人參

白朮

白茯苓

去皮

當歸 川芎

赤芍

生地黃

防風

羌活

獨活

天麻

南星

陳皮

黃芩

甘草

右剉生薑煎服

○一論風濕相搏，一身盡痛，以益氣湯加羌活防風，藥本蒼朮治之，如病去，勿再服，以諸風藥損入元氣，而益其病故也。

○一男子兩脰痛不可忍者，臨川徐攢吾試効。

黃芪

蜜炒

揀參五錢

當歸身

酒洗

一錢

熟地黄一兩

蒼朮

米泔製

獨活一兩

杜仲

酒炒

一錢

牛膝去蘆酒洗一兩

秦艽

一兩

官桂三錢

小茴

鹽酒炒

五錢

桑寄生一兩五錢

木瓜

五錢

右為細末，酒打麩糊為丸，如梧桐子大，每服百丸，空心酒下。

○一論雷火鍼

蒼朮

五錢

川芎三錢

硫黃

二錢半

川山甲三錢

蔓荊子三錢

皂角三錢

麝香五分

雄黃二錢

艾葉不炒

右爲末紙捲如指大以葺紙七層貼患處將藥燃起淬之知痛則止
一論尉法治諸風惡毒冷痺麻木腫痛或遍身骨節痛始覺腫痛劇多
卽散。

蒼朮二兩 羌活一兩 獨活一兩 蛇床子五錢 蔓荊子五錢

川山甲五錢 雄黃三錢 硫黃三錢 麝香三分

右爲末炒熱以絹包熨患處下法以醋拌炒作餅燒秤挺放餅上用絹
包熨之

一論雷火鍼法

呪曰

天火地火三昧真火鍼天開鍼地地裂鍼鬼滅鍼人人得永生
百病消除萬病消滅 攝遺

右法可遇患人應痛處針之用布三層或五層其病如滅視痛於痛處
穴上將桃針向燈火點着隨按念咒三遍針疾立除其針用五月五日

東引挑枝削去皮兩頭如雞子樣長五七寸用此

○一人每夜肢體時痛或用清痰理氣之劑不勞常痛加以導瀉腎痛漫腫形體倦怠內熱盜汗脉浮大按之微細此陽氣虛寒用補中益氣加附子一錢入參五錢腫痛悉愈又以十全大補百餘劑而康

○一人形體豐厚筋骨軟痛痰盛作渴喜飲冷水或用愈風湯天麻丸等藥痰熱益甚服半黃清心丸更加肢體麻痺余以為脚腎俱虛用補中益氣湯加減八味丸三月餘而痊已後連生七子皆躋七旬外科精誤云凡人久服加減八味丸必肥健而多子信哉

○一治白虎歷節風走注疼痛兩膝熱腫

虎脛骨酥炙 黑附子炮製去皮臍各一兩

右為細末每服二錢溫酒調下七日再服

脚氣

脈弦者風濡弱者濕洪數者熱遲滑者寒微滑者虛牢堅者實結則因氣散則因憂鬱則因怒細脈因悲

脚氣者濕熱在足而作氣痛也濕熱分爭濕勝則令人增寒熱勝則令人壯熱此其為証亦有兼頭痛者類傷寒惟其得病之始本於脚氣為異耳又不可以脚腫為拘亦有痛而不腫者名曰乾脚氣亦有緩總不隨者名曰緩風亦有疼痛不仁者名曰濕痺亦有轉筋變急者名曰風毒此在醫者體會而辨証爾各有治法不同大抵脚氣之疾壅疾也喜通而惡塞故孫真人曰脚氣之疾皆由氣實而死終無一人以服藥致虛而殞故脚氣之人皆不得太補亦不得太瀉是方也木通防已續斷通劑也可以去熱蒼白二木燥劑也可以去濕然川芎能散血中之氣犀角能利氣中之血先痛而後腫者氣傷血也重用川芎先腫而後痛者血傷氣也重用犀角若太便會者加桃仁小便澀者加牛膝脚熱加芩連時熱加石膏有痰加竹瀝全在活法初勿拘也凡脚氣攻心喘急

不止嘔吐不休皆死水犯火故也

○一論專治脚氣增寒壯熱者此濕熱在足而作氣痛也。

防已飲

蒼朮 鹽水炒

白朮

黃柏 酒炒

防已

生地黄 酒洗

川芎

檳榔

木通

犀角

甘草梢

右剉水煎空心服

○一論脚氣初發一身盡痛或肢節腫痛便溺阻隔先用此藥導之次用

當歸拈痛湯服愈

羌活導滯湯

羌活

獨活 各一錢 當歸 一錢

防已 炒一錢 大茴 酒蒸一錢

枳實 炒一錢

右剉水煎服

○一論濕熱脚氣為病肢節煩痛肩背沉重胸脇不利兼遍身疼痛下注

足脛腫痛脚膝生瘡赤腫及裏外生瘡膿水不絕或痒或痛並宜服之
常歸拈痛湯

羌活

茵陳各一錢當歸酒洗

防風去塵

知母去毛

澤瀉

猪苓

白朮去蘆各五分人參

苦參

升麻

葛根各四分蒼朮米泔浸四分黃芩酒炒

甘草各一錢

右剉水煎空心服

○一論三陽經脚氣流注脚蹠上熾熱赤腫寒熱如瘡自汗惡風用
人參敗毒散各一錢方見感冒門加蒼朮米泔炒大黃酒蒸各二錢
作一服生薑煎空心服皮膚瘙癢赤疹加蟬退
○一論風濕流注經絡間肢節緩縱不隨老人脚膝疼痛不能履地
七聖散

川牛膝酒浸杜仲黃酒炒續斷

川車薺

防風

川獨活

甘草各一兩

右焙乾為末每服二錢酒調服

○一治脚氣止痛奇方

乳香

沒藥

天麻

白附子

燿蠶

右剉各等分為細末每服五分空心酒調服

○一治濕氣攻注腰脚痛行步不得

當歸酒洗

肉桂

玄胡索

草薺

沒藥各二兩

杜仲酒炒

兩五錢

右為細末每服三錢空心温酒調下

○一治脚氣浮腫

川牛膝

去薑酒洗
一錢五分

威靈仙一錢

蒼朮

木泔水洗
一錢五分

漢防已一錢

五加皮

一錢五分

川獨活

一錢五分

當歸身一錢

川黃柏

蒸酒炒
一錢

右剉一劑生薑煎熟入酒一椀同服

○一有人氣如火從脚入腹者此虛極也蓋火起於九泉之下也此病
十不救一治法以四物湯加黃柏知母降火之藥服之外以大附子為
赤津調貼脚心湧泉穴以引火下行

一按此條言猶有未盡者如果勞怯陰虛之人有此因當作陰虛治若
壯實之人有此則足濕鬱成熱之候也予嘗見雨途行衣濕得此症以
後所製加味二妙丸一料服之而愈後醫數人皆驗若誤作陰虛治則
成痰疾矣

○一治足跟痛有痰有血熱

血熱四物湯加黃柏知母牛膝有痰唾者五積散加木瓜

○一論兩足濕痺疼痛或如火燎之熱從足趾熱起漸至腰跨或腐痺痿
軟乃濕熱為病皆貧酒嗜慾乘風所致然耳

加味二妙丸

蒼朮酒製

黃柏酒浸晒乾

牛膝去蘆

玉壽世保元

戊集五卷

四十八

當歸尾 酒洗 兩

草薺 一兩

防已 一兩

龜板 酥炙 一兩或六兩 龜板加熟地黃二兩亦可

右為細末好酒打糊為丸如梧子大每服七十丸空心鹽薑湯下

○治一切寒濕虛冷脚氣腫痛焦枯經年臥床不能動履者獨活寄生湯

各等分入好酒煮熟飲之效方見中濕門

○一論男婦五勞七傷腎氣衰敗精神耗散風濕流注脚膝酸疼行步艱

辛飲食無味耳焦眼昏皮膚枯燥婦人臍冷無子下部積寒腸風痔漏

吐血瀉血諸嵐諸氣並皆治之

經進地仙丹 西園公屢驗

黃芪 炒一兩 五錢

人參 一兩

白朮 去蘆 二兩

白茯苓 去皮 一兩

何首烏 三兩

川烏 炮一兩

大附子 炮去皮 四兩

白附子 炮二兩

牛膝 酒浸 四兩

肉蓯蓉 酒浸 四兩

川椒 去目炒 四兩

覆盆子 二兩

兔絲子 酒制 二兩

川草薺 二兩

骨碎補 去毛炒 二兩

烏藥 二兩

天南星炮二兩 防風二兩 羌活二兩 木鱉子夫鼓二兩

地龍去土三兩 金毛狗脊去毛二兩 赤小豆二兩 甘草一兩

右為細末酒煮麩糊為丸如梧桐子大每服三四十九空心溫酒送下

陶隱君以此地仙丹編入道藏經時有人母幼年時得風氣疾久治不

差五十餘年隱居修合其進二服諸病頓愈髮白返黑齒落更生人常

言者方二年無病可治冷病二年無藥可用噫有是哉余近若脚膝酸

痛服經進地仙丹三日而愈由是知天下無不可治之病醫書無不可

用之方特在於遇醫之明不明耳

二十四味輕脚丸 麩氣運用 草薺鹽水浸乾 杏仁米泔浸炒

當歸酒洗一兩 川芎一兩 杜仲黃炒一兩 木瓜七錢 檳榔一兩

牛膝酒洗七錢 木香七錢 續斷酒洗七錢 威靈仙七錢

枳殼一兩 羌活一兩 獨活七錢 細辛一兩

防風七錢

麻黃七錢

五加皮七錢

海桐皮七錢

石楠藤一兩

薏苡仁一兩

五靈脂七錢

乳香五錢

沒藥七錢

右為細末酒浸壹晝為丸如梧桐子大每服五十九丸辣桂荆芥湯下或枳殼木瓜湯下

○一論寒濕脚氣疼痛不仁兩尺脉來沉細者此痺症也內經曰寒氣勝者為痛濕氣勝者為著痺令疼痛不仁是寒而且著也兩人主兩足脉來沉者為裏遲者為寒是方也用桂附溫其寒已木制其濕甘令脾家藥也扶主氣之不足制濕氣之有餘然必冷服者欲桂附之性行于下而不致其橫行于上也

六物附子湯

大附子炮法桂心

防己各四錢

白朮去蘆

白茯苓去皮甘草炙一錢

白朮煎空心服

○一論兩膝腫痛，膝枯絆者，名鶴膝風也。或初後不詳，感冒寒濕，或法
水履霜，以致兩足痛痺，如刀剔虎咬之狀，膝腫大不能行動。

補中益氣湯，去柴升、陳皮，加附子、牛膝、杜仲、防風、羌活、川芎、白芍、熟
地、黃草、薤白、已生薑、葱、酒、煨。

○一論兩腿酸軟，或赤或白，足跟患腫，或痛或痒，後痛或如無皮，或加破
裂，日晡至夜，脹痛熾熱，以補中益氣湯加入八味丸料，補其肝腎。

○一論兩足心發熱作痒，以滾湯浸漬，漬而出水，肌體骨立，作渴吐痰，此
脾腎虛而水乏為痰也。以補中益氣湯兼進六味丸，久而元氣復而諸
症愈。

○一論脚發熱，則咽喉作痛，肉熱口乾，痰涎壅上。此腎經虧損，火不歸經，
以補中益氣湯加麥門、五味及加減八味丸服愈。

○一論兩腿逸，則筋緩痿軟而無力。勞則作痛，如針刺，脈洪數而有力。此
腎肝陰虛火之象也。用六味丸而愈。

○一論八味丸治脚氣足少陰經脚氣入腹腹脹痛上氣喘急腎經虛寒所致也此証最急以腎水采心火死不旋踵八味丸方見補益

○一論八味丸治脚弱加續斷草蘇耆人加牛膝鹿茸○治鶴膝風加牛膝入參鹿茸

○一人以兩足發熱或脚跟作痛用六味丸及四物湯加麥門五味玄參芩之而愈後因勞發熱惡寒作渴煩燥用當歸補血湯而安

○一人足熱口乾吐痰頭暈服四物湯加黃連黃柏飲食即減痰熱盡除用十全大補湯加麥門五味山藥山茱而愈

○一論風濕氣足脛腫痛用此藥洗立効

- 防風
- 荆芥
- 苦參
- 菴白草
- 地榆
- 青藤
- 麻黃
- 蒼耳草
- 蒼朮
- 生葱
- 炒鹽
- 威靈仙各一兩

右用米一桶煮熱於桶內薰蒸痛處出微汗待湯稍溫再洗痛處一二

次覺痛減如貧者只用桃柳榆槐桑椿木枝煎水先亦効
○一論凡人患寒濕脚氣疼痛不止者內服煎劑外宜以此湯再洗之若
壅疾洗之無有不良。

○一椒湯洗法

用川椒二兩葱一握生薑如掌大一塊水一盆煎湯洗之

○一治遠行脚打成泡

用葱調生葱糊貼道夜間乾不再發破

○一論兩足痛如刀割不可忍者

先用生薑切片蘸香油擦痛處隨用生薑火燒熟搗爛敷患處須更
薑乾而痛止神効

○一論脚氣冲心

用白礬三兩煎水浸洗兩足良久自愈

○一論脚走急欲石塊脚底墜腫不能行步痛不可忍者

用燒紅磚一塊將草鞋裏於尿筒內下宜或半日取來放在紅磚上將腫脚底立在草鞋上火逼尿氣入皮裏即消此病諸方不載如不早治爛入脚底俗曰_爛。

○一治脚氣腫痛。鶴膝風不能動履。

用真生薑汁一碗入牛膠一兩熬成膏入乳香沒藥末各一錢攪勻。

絹帛攤貼腫消痛止次日將滾水入藥碗內去水又攤又貼効不_能。

補中益氣湯見內傷 六味丸 八味丸 俱見補益當歸補血湯見_後。

十全大補湯見補益

補遺

○一論鶴膝不能動履腫痛難當及麻木風濕屬虛寒者宜之。

神仙風藥酒

秦歸身一兩 大川芎一兩 片白水去蘊 白茯苓去殼

大川烏炮五錢 軟防風五錢 荆芥穗五錢 羊角天麻五錢

全蠍 炒三錢 香白芷 五錢 北細辛 五錢 何首烏 五錢

新草烏 炮五錢 威靈仙 五錢 金釵石斛 五錢 川牛膝 去蘆五錢

川獨活 五錢 羌活 三錢 麻黃節 三錢 石楠藤 五錢

薏苡仁 酒洗 赤桂 五錢 川乾薑 五錢 尖橫柳 五錢

宣木瓜 五錢 真石乳 二錢 明沒藥 二錢 川續斷 五錢

白蒼朮 米泔炒 嫩黃芪 五錢 兩頭尖 五錢 南木香 一錢

漢防己 五錢 桑寄生 五錢 赤茯苓 一兩 虎脛骨 殿乳浸

骨碎補 五錢 甘草節 五錢

右合行下處用生頭酒九升文武火熬熟去火毒早晚飲滿瓶

○一治男婦風濕相搏腰膝痛或因平臥濕地雨露所襲遍身骨節疼痛

風濕脚氣並治

秘傳藥酒方

白芷 桔梗 白芍 川芎 麻黃

茯苓

半夏

肉桂

甘草 多一兩 陳皮

厚朴 薑汁炒

枳殼 炒

當歸 路一兩

蒼朮 炒 兩 牛膝 去蘆 兩

杜仲 酒炒

木瓜 五錢

檳榔 五錢

烏藥 二兩 防已 一兩

獨活 一兩

右各剉以麻布袋盛用無灰好酒三斗將藥袋懸胎於壘內密封固壘口放鍋內煮一時久然後取出過三日後去藥隨量飲之椿腦為末酒糊為丸如梧桐子大每服七八十丸空心溫酒下○腿膝疼痛加川烏虎脛骨○腰痛加破故紙肉蓯蓉枸杞子

江疾秘傳藥酒方

治脚膝腫痛并手足痛

五加皮 八兩

川牛膝 去蘆

杜仲 酒炒

當歸

懷生地黃 各三

地骨皮 二兩

右剉散用好酒二斗入藥重湯煮去渣香土埋三日出水吞隨飲之

○一婦人下體腫痛用入參敗毒散加蒼朮枳殼靈仙痛殺又以酒

湯加蒼朮黃柏防己紅花澤瀉

○一秘方治脚氣腫痛用木瓜爲末好酒調敷患處立止。

○一治兩脚俱是疔瘡腫毒骨痛用獨蒜切片鋪於痛處每蒜一片用艾

一壯去蒜再換再灸灸至愈。

癰疽

內經曰。肝脉大急沉。皆爲疝。心脉滑搏急。爲心疝。肺脉沉搏。爲肺疝。又三陽急爲癰。三陰急爲疝。

夫疝者。由榮衛虛弱。寒濕不調。致令邪氣乘虛入於心腹中。遂成諸疝。或則小腹疼痛。或達臍逆上。捨心甚。則手足厥冷。或大小便閉結。其諸疝因邪氣留滯。乃成積聚。令人羸瘦。少氣。洒淅寒熱。嗜臥。飲食不養。肌膚或腹滿嘔泄。遇寒則痛。又有婦人小腹腫痛。攻及二腿者。亦疝氣也。

○一論疝氣者。陰腫腹痛也。

川練子

小茴香

破故布

青蘘

山茱萸

酒蒸去核

吳茱萸

三稜

莪朮

通草

橘核

荔枝核

甘草 各等分

右剉水煎空心服。立効。收効加馬蘭花蒼朮。○如夏秋之月暑入胸臆。

疝氣作痛加黃連香茹扁豆木通滑石車前子。

○一論疝氣腫痛。或大便閉結。或小使赤澁。或有寒有熱。兼治之神方也。

川練子

酒蒸去核取肉

胡蘆巴

炒

小茴

鹽酒炒青蘘

黑丑搗碎

木香

大黃

滑石

木通

吳茱萸 炒

烏藥

車前子

各等分

右剉水煎空心服。

○一治疝氣小腸氣。南塘姪試効。

猪苓

澤瀉

蒼朮

赤茯苓

桂皮

川木通

白芍

川練子

玄胡索

烏藥

青皮

紫蘇

馬蘭花

橘核仁三十尖攪和

甘草各等分

右劉生薑煎服。

○一論治七疝及奔豚小腸氣臍腹太痛

七疝湯 知府劉永山傳一方。

玄胡索

小茴香 酒炒 川練子

全蝎炒

人參

大附子炮

山梔子炒 木香各等分

右為細末每服三錢空心溫酒調服。

秘方 治症同前。

青鹽二錢

木通

甘草各一錢 川烏炮三錢 燈草一錢

右剉一劑水煎空心溫服。

○一論治外腎腫痛諸般疝氣不論新久一服如神予嘗用此丸治患疝氣偏墜已經十餘年服至二料除根永不復發。

木香金鈴丸 嚴副使方

木香

乳香

沒藥

大附子 麩裹火煨

小茴 鹽酒炒 川練肉

玄胡索

全蝎

人參 各等分

右為細末。好酒打糊為丸。如梧子大。每服百丸。空心熱酒送下。服正

○一論疝氣發於寒月者。寒邪入膀胱也。

加減五積散方見中寒。依本方加玄胡索專治醉飽後色慾不節。偏傷小

腹。致成疝氣。其症自小腹連兩脇下。心頭吊痛。額出微汗。宜之。

○一論疝氣發於暑月者。暑氣入膀胱也。

加減香苓散

枳殼 麩炒

陳皮

香附

蒼朮

麻黃

香茹

猪苓

澤瀉

木通

滑石

車前子

三稜

義木

川練子

玄胡索

甘草

右劉蕡葱煎熱服。○專治偏墜氣初起，增寒壯熱，發表輕者，一服而愈。

○一論疝氣偏墜疼痛，屬腎虛者，久服除根。

六味地黄丸，方見補益全料內加。

人參 三兩
甘枸杞子 三兩
巴戟肉 三兩

懷生地黃 六兩用桂 下兩酒二碗

破故芷 二兩水三碗煎地黃熟，大小茴香各一兩，青鹽三錢，煎至

右為細末，酒打麵糊為丸，如梧子大，每服百丸，淡鹽湯下。

○一論狐疝者，晝則氣出而腎囊腫大，令人不堪，夜則氣入而腫脹皆消。

稍無疾苦，蓋狐之為物也，晝則出穴而溺，夜則入穴而不溺，以斯症消。

之，故曰狐疝。夫晝陽也，夜陰也，晝病而夜否者，氣病而血不病也。

補中益氣湯，方見內傷，依本方加酒炒黃柏知母。

○一論癩疝者，頑疝也，畢九雖大而無疾苦也。此以父子相傳，得於有生。

之初已然，非若生之後，三因所致之疾也，故不必主治。

○一論諸疝疼痛。太學生徐擴五傳

猪苓

澤瀉

木通

赤茯苓

胡盧巴

川練肉

海藻

牽牛

巴戟

桂竹茹

右剉水煎空心服。

○一論治疝氣。許碧止傳。

檳榔一兩

木通五錢

橘核

川練子

小茴香

白茯苓

白朮

猪苓

澤瀉各一兩

右剉水煎空心服。

○一治偏墜氣痛。用江子殼橘核角茴三味同炒至褐色。去殼將三味搗

爛頭酒煎服立愈。

○一論治偏墜氣。

猪懸蹄燒存性為末。每服三錢黃酒調服。

○一論治水腫偏墜氣。

○ 猪毛烧灰。每服二錢。空心熱酒送下。立已。一方加小茴炒。

○ 一治疝氣偏墜腫痛不可忍。

○ 槐子一錢炒為末。入鹽三分。空心熱酒送下。立消而止。

○ 一治陰囊風痒。

○ 浮萍煎水洗之。如成瘡。用黃連輕粉雞蛋白。燒灰。將末擦之。即已。

○ 一治陰囊痒不可忍者。

○ 猪肉湯加胡椒煎湯洗之。立已。

○ 一治陰囊腎莖肛門癢痒。抓破出血。好了又痒者。人言鹹醋二碗。熬至一碗。洗患處。立已。

○ 一治外腎腫大疼痛者。

○ 大黃末。鹹醋調敷。患處立消。

○ 一周少峰親家患疝氣偏墜腫痛不可忍者。遇一秀才傳一方。用草土水和作乾泥。拍作木餅。火柱架於火上。烘熟。熨痛處。冷則再易。立愈。

○一外腎因撲損而傷，藥丸偏大有時疼痛，者中有瘀血，名曰血疝，宜於夜分之時，自以一手托其下，一手按其上，由輕至重，凡弄百迴，彌月之間，瘀血盡散，陳氣皆行，誠妙術也。雖年深日久，無不愈之。

○一治外腎着驚縮上者

麝香二錢

朝腦三錢

高荳子一茶鍾

右用高荳葉搗為膏，貼臍上。

○一治疝氣 戴耕愚傳

荔枝核

三錢 燒存性

小茴 炒一錢

川練肉一錢

右為末，鹽酒調服。看時令先要發散寒暑。

○一治疝氣偏墜 車左源傳

蒼朮一斤

童便人乳

酒

各浸三日炒乾

橘核一兩

右為末，酒糊為丸。每服百丸，空心酒送下。

○一治外腎腫大，麻木痛硬，及奔豚疝氣偏墜。

七製金鈴丸

川練子不蛀者四十箇去殼切片分七製。○七箇用小茴香二錢五分慢火同炒并用茴香。○破故紙二錢五分同炒并用故紙。○黑牽牛二錢五分同炒并用牽牛。○鹽一錢同炒并用鹽。○斑猫土四箇去翅同炒去斑猫不用。○巴豆肉十四箇切作四段同炒去巴豆不用。○蘿蔔子二錢五分同炒去蘿蔔子不用。○外加

大茴香炒

青木香

南木香

辣桂各二錢五分

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三十丸食前酒下積氣可助打降痰血症本方加玄胡索半兩略炒沒藥為末酒調下

○一治腎大如拳不過三服除根

舶上小茴香

青皮

荔枝核各等分

右剉散炒黃出火毒為細末酒調一合日進三服

○一治疝氣外腎腫服神效

四聖散

小茴香炒 川山甲炒 全蝎炒 南木香 各等分

右為末。每服二錢。酒調服。一服立效。

痿躄

痿者手足不能舉持是也。又名軟風。下身瘦弱不能趨步。及手戰搖不能握物。此症屬血虛。血虛乃陰虛。陰虛生內熱。熱則筋弛。步履艱難。而手足軟弱。此乃血氣兩虛。風濕之症。古方通用風藥治之。非也。我東垣丹溪二先生治法。始合經意。而以清燥湯主之。丹溪又分濕熱濕痰氣虛血虛瘀血等法。濕熱用東垣健步丸。燥濕降陰火。如蒼朮黃柏黃芩牛膝之類。濕痰。一陳湯加蒼朮白朮黃芩黃柏竹瀝薑汁氣虛。四君子加蒼朮芍藥之類。血虛。四物湯加黃柏蒼朮煎送補陰丸。亦有食積死血妨礙。不得下降者。宜從食積死血治之。他如潛行散。二妙散。虎潛丸。

治痿之要藥也。

○一論六七月間濕令大行。子能令母實。而熱旺濕熱相洽。而刑庚太勝。故寒涼以救之。燥金受濕熱之邪。經寒水生化之源。源絕則腎筋痿。之病大作。腰下痿軟癱瘓不能動履。

清燥湯

黃芪錢五分 蒼朮米泔浸

白朮去蘆炒

陳皮

澤瀉各五分

人參

白茯苓去皮

升麻各三分

麥門冬去心

當歸身酒洗

生地黄

神麴炒

猪苓各二分

黃柏酒炒

柴胡

黃連各一分

五味子九箇

甘草炙二分

右剉丁劑水煎空心溫服。

○一論此藥能去風順氣活血壯筋。治痢後泄瀉痛。不能行履。名曰痢風。或兩脚腫痛。足脛枯細。名曰鶴膝風。治一切麻痺痿軟風濕。按

虛之候

大防風湯

當歸 酒浸一錢 川芎 七分

白芍 酒炒一錢 熟地黃 一錢

黃芪 蜜炙一錢 人參 五分

防風 一錢 羌活 五分

牛膝 酒洗五分 杜仲 姜炒一錢 白朮 五錢 天麻 一錢 大附子 七分 炮去皮臍

甘草 炙五分

右剉一劑。生薑五片。棗一枚。水煎。溫服。

○按右四物以補血。參芪朮草以補氣。羌防以散風濕。以利關節。牛膝杜仲以補腰腎。以附子行參芪之氣。而走周身脉絡。蓋治氣血兩虛。挾風濕而成痿痺。不能行者之聖藥也。觀其治劑。後風可見矣。然可以治不足之痿弱。而不可治有餘之風痺也。

○一論五子益腎養心丸。治精血虧損。下部痿軟。無力不能步履。益見補

養血壯筋健步丸 治症同前

黃芪鹽水炒

山藥一兩

五味子一兩

破故紙鹽水炒

人參一兩

白芍酒炒

熟地黃四兩

枸杞子一兩

牛膝去鹽酒炒

兔絲子酒製

當歸酒洗

白朮去鹽炒

杜仲薑汁炒

虎脛骨酥炙

龜板酥炙

蒼朮米泔浸

黃栢鹽水炒

防風六錢

羌活酒洗

漢防己五錢

右為細末用猪香髓七條煉蜜為丸如梧子大每服百丸空心鹽湯下

○一治一切麻痺痿軟風濕血虛之候又治潮後脚弱緩痛不能行復名

曰刺風或兩脚腫痛足脛枯細名曰鶴膝風以十全大補湯去肉桂加

防風羌活牛膝杜仲大附子煨

○一人兩足痿弱不能動止予以

鹿茸

人參各五錢

右剉一劑水煎空心溫服連進數服而愈

○一治兩足痿弱不能行者

○一治腎氣虛憊，腰膝酸疼，行步無勞。
起痿丹

用新羅少燒紅，以好酒洗之，候乾，布包焙，膠上，這處空，宜行勤。

兔絲子 酒洗 艾爛搗餅

肉蓯蓉 酒浸 川草薺

破故紙 酒炒 胡蘆巴 酒炒

沙苑蒺藜 微炒 川牛膝 去蘆酒洗

川杜仲 酒炒 防風 酒洗

甘枸杞子 各二兩

河間方去枸杞加桂減半

左為末，酒煮，豬腰子搗爛，和丸，如梧子大，每服七八十丸，空心酒下。

消渴

消渴脈數大者，活，脈小，病深，固難脫。

夫消渴者，由壯盛之時，不自保養，任情縱慾，飲酒無度，善食膾炙，或服丹石，遂使腎水枯竭，心火大熾，煩三焦，猛烈五臟乾燥，由是渴利生焉。丹

煩渴口燥渴口強中三證者消渴也。多渴而利燥渴者由熱中所在但飲食皆作小便自利不渴者人虛弱短氣強中者陽具不交而精薄自出凡消渴之人當防患癰疽所怕者一飲酒二房勞鹹食及麪俱忌也。大抵脈大者易治細小者難醫也。

○一論消渴引飲無度尿實者是也。

黃連 牛乳汁 生地黄汁 生藕汁 各等分

右二味及汁為膏入和牛乳黃連佐乾梨為膏徐徐於舌上以白湯此少送下。或將前一味藥和汁為丸如梧子大每服五十九白湯送下。一日進十次。

○一論治三消總治之方服之立應。

人參 白朮 去蘆 白茯苓 去皮 當歸 酒洗 生地黄 各一錢
黃栢 酒炒 知母 去皮 黃連 麥門冬 去心 天花粉
黃芩 各八分 桔梗 五分 甘草 三分

右到丁劑水煎服。

天池膏 治三消如神

天花粉

黃連 各半斤

人參

知母 去毛

白朮

各四兩

五味子 三兩

麥門冬 去心 六兩

懷生地黃汁 二碗

藕汁 二碗

入乳

牛乳 各一磅

生薑汁 二酒鍾

右先將天花粉七味切片用米泔水十六碗入砂鍋內浸半日用桑柴火慢熬至五六碗濾清又將香搗爛以水五碗煎至二碗同前汁又煎去二三碗入生地等比慢熬如湯加白蜜一斤煎去白沫又熬如膏次入磁罐內用水浸三日去火毒每用二三匙或吞之或用白湯送下

○一論消渴口乾心熱用天花粉一味水煎與茶服之立效

○一論治三消渴神效用繅絲湯如無繅絲湯却以原籍繭殼絲編煎湯皆可代之無時飲之極效蓋此物屬火有陰之用大能瀉胸膈中伏火引陰水上潮于口而不渴也。

○一論陰虛火盛煩渴引飲無度

養血清火湯

當歸 錢

川芎 八分

白芍 酒炒 一錢

生地黃 酒洗 一錢

黃柏 鹽水炒 五分

知母 一錢

麥門冬 一錢

石蓮肉 五分

天花粉 七分

黃連 八分

烏梅肉 五分

薄荷 五分

甘草 五分

右剉水煎溫服

○一治消渴病通用

生地黄膏

生地黄束如碗大一把洗切研細以新水一碗調服入冬蜜一碗同煎至半取出入入參五錢白茯苓去皮二兩為末拌和磁器密收其匙挑服夏月可加五味子麥門冬

○一治消渴

玉泉丸

人參

黃芪

半斤 半斤

白茯苓

乾葛

麥門冬

烏梅肉 焙

甘草

各一兩

天花粉

五錢

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸溫湯嚥下

○一入消渴引飲無度或令食韭苗或炒或作羹無入鹽日兩三次其渴

遂止

○一入消中日夜尿七八升都靡角燒令為炭末以酒調服五分匕日三

漸加至方寸匕

○一治消渴

天華散

天花粉 一兩

生地黃 一兩

麥門冬 五錢

五味子 五錢

粉葛 五錢

甘草 五錢

右剉糯米一撮水煎服

○一論腎水枯竭不能運止作消渴恐生癰疽

參芪救元湯

黃芪蜜炒

人參

粉草炙

麥門冬

去心五味子

各等分

右剉水煎入朱砂少許不拘時服

○一論一常人平日口乾作渴因飲酒食炙燥補劑房勞凡若此類過多致冷腎水枯竭不能上制心火故有此証後必有疽發也宜先服此以絕其源及癰疽後服此尤有益也

八味丸

懷生地黃

酒浸兩焙乾二兩

山藥

一兩

白茯苓

去皮八錢

牡丹皮

八錢

山茱萸

去核一兩

澤瀉

酒浸焙乾八錢

五味子

去核一兩五錢

肉桂

五錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五六十九五更時淡鹽湯送下

溫酒亦可

痙病

痙，痙字之誤也。強，強者，堅強而勁直，頭項牽急而背反張也。此以風寒濕三者客于太陽，傷其大筋，筋牽而急，故令痙也。然得之風濕者，令人有汗而不惡寒，名曰柔痙；背人以桂枝加葛根湯主之，是也。得之寒者，令人無汗惡寒，名曰剛痙；背人以葛根湯主之，是也。方也有麻黃杏仁，則可以發表散寒；有桂枝芍藥，則可以解肌驅風；有防風，防已，則可以驅邪勝濕；有人參甘草，則可以益氣柔筋；有小芎黃芩，則可以利陰去熱。乃附子之熱，可以溫經，而亦可以去濕者也。

二痙歌

原來痙病屬膀胱

故分兩証有柔剛

有汗為柔，見前端

口噤如癰，身反張

無汗為剛，須易識

桂枝葛根湯救急

此是傷風感寒濕

惟有葛根湯第一

二証皆宜續命湯

剛瘥去程用麻黃 桑瘥去麻黃用桂 只依此法最為良

小續命湯

麻黃去節 人參 黃芩酒炒 白芍酒炒 川芎酒洗

防已 杏仁去皮尖桂枝 甘草各一錢 防風

大附子炮去皮臍 右剉丁劑水煎服

葛根湯

葛根 麻黃 桂枝 芍藥 甘草

右剉生薑大棗水煎服

○一論剛柔二症頭搖口噤身反張手足攣搖頭面赤項強急與瘥從同

治法

如聖飲

柴胡 黃芩 半夏 赤芍 川芎

白芷 當歸 防風 羌活 烏藥

甘草

右劉生薑水煎服。○有汗是柔症加白朮桂枝。○無汗是剛症加麻黃蒼朮。○口噤咬牙大便實加大黃利之。

○一論瘧病有一發熱惡寒頭項強腰脊反張口噤面赤癩瘕如癰有汗柔症無汗名剛以補中益氣湯去黃芪柴升加川芎白芍熟地白茯苓。○剛症身熱面赤脉緊加防風羌活黃芩乾葛去白朮。○柔症身不熱手足冷脉沉細加熟附子羌活。○風痰症加羌活防風瓜蒌枳實桔梗片苓竹瀝薑汁去入參白朮。○破傷風症加殭蚕全蝎防風羌活南星瓜蒌仁枳實黃芩桔梗竹瀝薑汁去白朮人參。○汗吐下多發症者本方倍入參黃芪當歸生地荆芥羌活白朮。

濁症

脈兩尺脉洪數必便濁失精

精之主實在心精之藏則在腎凡人酒色無度思慮過情心腎氣虛不能
管攝往往小便頻數便濁之所由生也因小便而出者曰尿精因見聞
而出者曰漏精心不足而按動者為赤濁心不足而腎冷者為白濁陰
不升陽不降上下乖換是以有清濁不分之症大率多是濕痰流注直
燥中官之濕兼降火升舉之法此為至要之語也

○一論便濁之症因脾胃之濕熱下流滲入膀胱故使便濁赤白渾濁不
清也宜燥中官之濕用升麻柴胡提氣使大便潤而小便長不宜用寒
涼傷血之藥

主方

陳皮 八分 半夏 八分 茯苓 一錢 蒼朮 七分米泔炒 黃柏 七分酒炒

柴胡 七分 升麻 三分 白朮 五分去膜 神曲 炒五分 牡蠣 煨五分

梔子 炒一錢 蛤粉 三分 滑石 一錢 甘草 三分

右剉下劑生薑三片白果九枚水煎空心服渣再煎服忌煎炒辛辣物

○一論心中煩燥思慮憂愁抑鬱小便赤濁或有沙膜夜夢遺精之類
 痛便赤如或酒色過度上盛下虚心火上炎肺金受剋故口苦咽乾
 成消渴四肢倦怠男子五淋婦人帶下赤白五心煩燥此藥溫平清心
 養神秘精大有奇效 赤濁者心虛有熱也
 清心蓮子飲

石蓮肉

人參 各二錢五分

黃芪 蜜炙

赤茯苓 各二錢

麥門冬 去心

地骨皮

黃芩

車前子 各一錢五分

甘草 三分

熱加柴胡薄荷 各一錢五分

右剉下剉燈草十根生薑三片水煎空心服○上盛下虛加酒炒黃和

知母各一錢

○一論心經伏暑小便赤濁而有熱也

加味四苓散

人參 減半

白朮 去蘆

赤茯苓 去皮 猪苓

澤瀉

香薷

石蓮肉

麥門冬

去心各等分

右剉水煎空心溫服

○一論小便白濁頻數無度凝白如油光彩不定凝脚滲下凝如膏稠此真元不足下焦虛寒之所致也。

葶藶飲

益智仁

川葶藶

石菖蒲

烏藥

一方加茯苓甘草

右各等分剉一劑水煎入鹽一捻空心溫服。○腎虛加牛膝杜仲山藥

○便赤加澤瀉麥門冬

○一論白濁初起或半月者下焦虛熱之所致也。

滋腎散

川葶藶

麥門冬

去心遠志去心

黃柏酒炒

兔絲子酒炒

五味子酒炒各等分

右劉一劑竹葉三片燈草一團水煎空心服
○一論赤白濁乃水火之不分也
水火分清飲

益智仁

草薺

石菖蒲

赤茯苓

車前子

猪苓

澤瀉

白朮去蘆

陳皮

枳殼炙炒

麻黃各等分甘草二分

右劉半水半酒煎空心服久病去麻黃勿升麻

○一治遺精白濁

玉環丹 弟雲嵩傳

五色龍骨

左顧牡蠣

蓮花鬚

芡實

石菖蒲

五味子

黃柏酒炒各一兩

丁方用石蓮子去石菖蒲

右為細末用金櫻子煎湯為糊入臼內搗千餘下成劑為丸如梧子大

每服五丸，送湯下，送物服之。

○一治遺精白濁

山藥 一兩

黃柏 酒炒二兩

牡蠣 火煨醋淬

白茯苓

去皮一兩

右共為細末，酒糊為丸，如梧子大，每服五十丸，空心水酒送下。

○一論白濁夢泄遺精及滑出而不收者

樗根丸

樗根白皮

有灰者是黃柏 炒褐色

蛤粉炒

青黛

乾薑 炒黑

滑石 各等分

右為細末，水和丸，如梧子大，每服百丸，空心溫酒下。虛勞四物湯下。

○一論白濁經年不愈，或時夢遺，形體瘦弱，當作心虛治之。

定志丸

遠志

甜葶

木泡

石菖蒲

各二兩

人參 一兩

白茯苓

去木三兩

黃柏

酒炒

二兩

蛤粉

煨二兩

右為未煉蜜為丸如梧子大朱砂為衣每服三十九空心米湯下

○一治小便白濁出髓條者

人參

白朮

白茯苓

青蘘

破故紙

大茴香

益智仁

酸棗仁炒

左顧牡蠣煅各一兩

右為末酒糊為丸如梧子大每服三十九溫酒米飲任下

○一論瘦人陰虛火動患赤白濁者

清離液坎湯方見勞瘵依本方加草薢牛膝山梔蒴藟赤芍藥

○一論久患白濁不止而作頭暈者以益氣湯加白茯苓半夏

○一論發熱口乾小便頻濁太便閉結盜汗遺精甚至廢寢用當歸六黃

湯二劑盜汗頓止用六味丸一便調和用十全大補湯及前丸兼服月

餘悉愈

○一論肥人濕痰患赤白濁者

二陳湯方見痰飲依本方加蒼朮白朮人參當歸生地麥門山梔黃柏草

壽世保元

戊集五卷

卷七

薛牛膝篇蓄

○一論肝腎脾肺虛損赤白濁久不愈者六味丸補中益氣湯早晚各服六味丸方見補益補中益氣湯方見內傷依本方加白茯苓半夏

○一人久患白濁發熱體倦用補中益氣加炮薑四劑白濁稍止再用六味地黃兼服諸症悉愈

○一人患頭暈白濁余用補中益氣湯加茯苓半夏愈而後遺腰痛用山藥山茱五味草薢遠志頓愈又因勞心盜汗白濁以歸脾湯加五味而愈後不時眩暈用八味丸全愈

補遺

○一治遺精白濁

木賊

小川芎

各五錢

粉葛居其中

一兩

蛇退一寸半頭向上者

挂壁顯神通

右用酒炆空心服

○一治赤白濁 陳雲岳傳

木通 去節七錢 滑石三錢

粉草四錢

黃荊子一匁

右剉水煎空心服立已。

遺精

清精白濁當驗其久結就動緊一症之約。

天房泄若其候有三年少壯感燥腸逾暴強制情慾不自知覺此泄而病之滿而溢也是為無病不藥可也。或心氣虛不能止事此泄如能之側而出也。人多有之其病猶輕則以和平之劑治之真氣火虛心不閉念腎不攝精此泄如虛瓶而漏者也其病最重須作大補湯先治之後則○一論心所慕而作夢遺此君火既動而相火隨之治在心。

黃連清心湯

黃連

生地黃

當歸

人參

遠志 去心

白茯苓去皮

酸棗仁炒

石蓮肉

甘草

右劉水煎服加麥門冬去心尤妙

參藩恭與王驗方

治遺精

人參

石蓮肉

蓮鬚

芡實

麥門冬

去心

白茯苓

遠志去心

甘草

右劉水煎溫服。○丁方加石棗栢子仁石菖蒲黃栢酒炒

○一論心神寧靜則精固君相火息則溺清有是証者始因抗乎心攝乎精而然也龍雷火動其水濁而不澄尾閭不禁即精竭髓而不固治宜補心寧神滋陰固本

益智固真湯

黃芪五分

一錢

人參三錢

白朮

去履

白茯苓

去皮木

當歸身酒洗

白芍

酒炒

麥門冬

去心

五味子

十二粒夏月

巴戟肉三錢

益智仁

去壳

酸棗仁

一錢

山藥

一錢

澤瀉 一錢

升麻 五分

黃連 酒炒 一錢
黃芩 一錢

黃柏 酒炒 七分

知母 一錢

蓮花 酒炒 一錢
甘草 稍生 一錢

右剉分作二劑。水煎。空心服。

○一論心神不安。腎虛。每自泄精等症。

寧神固精丸

黃柏 酒炒

知母 酒炒 各一兩

龍骨 煨

芡實

蓮蕊

白茯苓 酒炒 各一兩
遠志 去心

山茱萸 肉 各三兩

右為細末。煮山藥。糊為丸。如梧桐子大。朱砂為衣。每服五十丸。米湯下。

○一論夜夢遺精。或滑精。虛損之極。久不能止者。

滋補丹

人參

白朮 去蘆 炒
白茯苓 去皮
當歸 酒洗

川芎

白芍 酒炒

熟地黃 酒蒸
甘枸杞子
杜仲 酒炒

牛膝 去蘆 酒洗

天門冬 去心

麥門冬 去心
破故布 酒炒
遠志 甘草水 泡去心
牡蠣 煨

龍骨

金櫻子

去毛蓮莖

甘草炙各等分

右為細末山藥末打糊為丸如梧桐子大每服百丸空心酒下

○一論男子發熱遺精或小便不禁俱屬脾腎虧損

補中益氣湯方見內傷合六味丸方見補益二方合作湯劑水煎服以滋化源

○一論嗜慾無度夢遺精滑晝夜長流百方罔效病將垂危者

玉堂丸 扶溝何晴嶽傳

蓮鬚色黃者佳

石蓮肉淨肉一斤

芡實淨肉十二兩

麥門冬水潤去心

右用公豬肚一箇入家蓮肉帶心皮一斤入砂鍋內水煮熟去肚將蓮

肉晒乾同前藥為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服百丸空心蓮鬚煎

湯送下其効如神

○一男子水藏虛倦遺精盜汗往往夜夢鬼交

獾豬腰一枚以刀開去筋膜入大附子末一錢七以酒蒸乾去根熟空

○一論養元氣生心血健脾胃滋腎水止盜汗除遺精降相火壯元陽
 養心滋腎丸 臨川徐紹志傳

人參 一兩

柏子仁 去油炒 一兩

當歸 酒洗 一兩

天門冬 去心 二兩

遼五味子 一兩

蓮肉 去皮心 一兩

黃柏 去皮鹽水炒 二兩

酸棗仁 炒 二兩

白芍 酒炒 一兩

石菖蒲 去毛 六錢

懷生地黃 酒洗 二兩

懷山藥 炒 一兩

芡實 去壳 一兩

蓮蓬 一兩

遠志 甘草水炮 一兩

懷熟地黃 酒蒸 二兩

麥門冬 去心 二兩

牡蠣 火煎 一兩

白茯神 去皮水 一兩

知母 去毛酒炒 二兩

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服七十丸空心鹽湯下

○一論神者精氣之空也神以御氣氣以攝精故人寐則神棲於心寐則神棲於腎心腎神之舍也晝之所夢男子夢交而精泄女子

夢交而精出是皆不知清心養氣之道者也斯人也神不守舍從欲而
動晝有所感夜夢隨之心不靜念腎不藏精久而不已遂成虛損或有
神氣萎靡愈慮猖狂風邪乘其虛鬼氣干其正與妖魅交通者是反難
狀之疾也以
鎮神鎖精丹主之

人參

白茯苓

遠志

甘草
去心

柏子仁

酸棗仁炒

石菖蒲

去毛
各一兩

白龍骨煨

牡蠣

各二
兩五錢

辰砂水飛五錢留

右共為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸漿湯下

○一治精滑久不愈

牡蠣炒錫炒內煨醋淬七遍為末醋糊為丸如梧子大每服五十九空

心虛湯下

一治心虛夢洩

用白茯苓去皮。下味為末。米飲空心調下。
○一治遺精虛漏。小便餘瀝。及夜多小便者。
用益智仁二十四箇。水煎。入鹽少許。同服。
○一夢泄不止。脉弦而大。

石蓮肉 六兩 甘草 一兩

右為細末。每服二錢。食前燈心湯下。

○下人勞則遺精。齒牙即痛。用補中益氣。加半夏茯苓芍藥。并六味地黃丸。漸愈。更以十全大補。加麥門五味。而痊。

○下人白濁夢遺。口乾作渴。大便閉澀。下後熱甚。用補中益氣。加芍藥玄參。并加減八味丸。而愈。

○下人莖中痛。出白津。小便閉時作痒。用小柴胡。加山梔澤瀉。炒連木通。膽草茯苓。二劑頓愈。又兼六味地黃丸。而痊。

○下人便血精滑發熱。○下男子尿血發熱。○下男子發熱遺精。或小便

不禁俱屬腎經虧損用_{地黃丸}益氣湯以滋化源並皆得愈

○一人午後有熱遇勞遺精其齒即痛此脾腎虛熱先用_{益氣湯}送_{六味丸}更以十全大補湯而愈

○一人夢遺精滑氣血虛損用十全大補湯加_{山茱山藥五味麥門}補中益氣湯見內傷 六味丸 八味丸 十全大補湯俱見補益

諸淋

脉盛大而實者生虛細而滑者死

夫淋者有五淋之別氣砂血膏勞是也皆由膏粱之味濕熱之物或燒酒炙肉之類過多或用心太過房勞無節以致心腎不交水火無制而成五淋之症名雖有五大槩屬熱者居多故有新久虛實之不同耳學者審症而變通焉慎毋膠柱以調瑟也

論氣砂膏勞血五淋

○氣淋為病，小便澀滯，常有餘瀝不盡也。○砂淋為病，陰莖中有砂石而痛，溺不得卒出，砂出痛止也。○膏淋為病，溺濁如膏也。○勞淋為病，遇房勞即發，痛引氣衝也。○血淋為病，遇熱則發，甚則尿血，候其鼻準色黃者，知其為小便難也。

○一論心經蘊熱，臟腑閉結，小便赤澀，陰閉不通，及熱游尿淋。○如酒後恣飲而得者，則小便澀出而痛，既出而癢，以此藥主之。

八正散

大黃

瞿麥

木通

滑石

葶藶

梔子

車前子

甘草各等分

右剉剉，燈草水煎，空心服。

○按右方治諸淋，屬實熱宜之。

○一治五淋神方

海金沙散

當歸酒洗

雄黃

川牛膝

酒洗

大黃

木香

海金沙 各等分

右為細末每服一錢五分臨臥酒調服兩服見效

○按右方治諸淋不問虛實宜之

○一治淋瀝疼痛兼紅淋

滋陰清火散

當歸

生地黄

熟地黄

黃柏

知母

黃芩

黃連

水通

桑白皮

右剉水煎空心溫服

○一治諸淋久不止者

加味滋陰散

當歸

川芎

白芍

熟地黄

陳皮

半夏

白茯苓

去皮

甘草 各五分

升麻

柴胡

牛膝去蘆

黃柏酒炒

知母酒炒

白木去蘆

蒼朮米泔浸炒

右剉水煎露一宿空心服

○一論諸淋多屬膀胱之氣虛弱不能運用水道而成諸淋也宜

補中益氣湯殊效方見內傷

○一論下淋入不止乃元氣下陷故也宜

補中益氣湯方見內傷依本方參芪減半加川芎白芍熟地半夏茯苓平

膝黃柏知母蒼朮水煎露一宿空心服

○一論縱慾強留不泄淫精滲下而作淋者

益元固真湯

人參

白茯苓

蓮蕊

巴戟

升麻

益智仁

黃柏酒炒各二錢

山藥

澤瀉各一錢五分

甘草稍三錢

右剉水煎空心溫服

○一治小便淋瀝不通又治老人虛寒者患死血作淋痛不可忍宜

六味地黄丸方見補老依本方倍茯苓澤瀉又治小便頻數不禁去澤瀉

鬼益智仁

○一治苦病淋瀝而莖中痛不可忍者

六君子湯方見補益加黃柏知母滑石石葶琥珀水煎服

○一治冷淋諸藥不効者

四君子湯方見補益加猪苓澤瀉木通連進二服又以兔絲子研極細用

雞翎管吹入小便孔內極効

○一治心經積熱小便澀及五淋

火府丹

生地黃二兩 棉管木通

黃芩炒各一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸木通煎湯送下加甘草

名導赤散

許學士云丁卒有瀉日飲水斗許不食者三月心中煩悶時已十月余謂

心經有伏熱與火府丹數服而渴止食進此本治然用以治渴可謂道變也。

○一李司馬莖中作痛小便使如淋口乾唾痰此思色精降而內敗用補中益氣湯六味地黃丸而愈。

○一儒者發熱無時飲水不絕每登廁小便澀痛大便牽痛此精竭復耗所致用六味丸加五味子及補中益氣其謹守得愈若肢體甚寒喜熱飲食用八味丸。

○一治老人陰痿思色精不出內敗小便水道澀痛如淋用八味丸加車前牛膝立効。

○一老人精已竭而復耗之大小便牽痛愈痛愈怒愈便則愈痛服以八味丸最有功效。

禳遺

○一治血淋

阿膠炒二兩 猪苓

澤瀉

滑石

赤茯苓各一兩

車前子 五錢

右剉水煎空心服

關格

夫關格者謂膈中壅有所礙欲升不升欲降不降欲食不食此為氣之橫格也必用吐其氣之橫格必在吐出痰也存痰以二陳湯探吐之吐中便有降有氣虛不運者補氣藥中升降

丹溪曰此症多死寒在上熱在下也寒在胸中過絕不入無入之理故曰格在下焦填塞不通無出入之由故曰關格則吐逆關則不得小便

內經云人迎與氣口俱盛四倍已上為關格關格之脈贏不能極於天地之精氣則死矣

○一論關格上焦痰壅兩手脈盛是也

枳縮二陳湯

枳實麩炒 一錢

砂仁 七分

白茯苓去皮 貝母去心

陳皮

蘇子

瓜蒌仁

厚朴姜炒

香附童便炒 川芎 八分

木香 五分

沉香 五分

甘草 三分

右剉丁劑，生薑三斤，水煎，入竹瀝，磨沉香，木香服。

○一陰陽關格前後不通，尋常通利太府，小便自行，中有轉胞，正症諸藥不効，夫救則脹滿悶亂而死，予嘗以甘遂末水調敷臍下，內以甘草節煎湯飲之，及藥汁至臍，二藥相反，胞自轉矣。小便來如湧泉，此救急之良訣也。

遺溺

夫尿者，賴心腎二氣之所傳送，溺就為傳送之府。心腎氣虛，陽氣甚，令致令膀胱傳送失度，則必有遺尿不禁之患矣。經云：膀胱不利為癃，不約

為遺尿也。大宜溫補。清心寧慾。又有產後不順。致傷胞胎。及小兒胞冷。俱能令入遺尿。朱禁谷須隨症治之。

○一論小便不禁。出而不覺者。是有熱不禁者。用

五苓散。亦見中身。依本方。去桂。加黃柏。黃芩。黃連。梔子。山茱萸。肉五味子。水煎。空心服。

○一論小便不禁。虛弱者。用

五苓散。方見中身。依本方。合四物湯。方見補益。加山茱萸。肉五味子。共十。一味。水煎。空心服。

○一治腎氣不足。小便頻數。日夜百餘次。

縮泉丸

烏藥

益智仁

各等分

右為細末。山藥糊。為丸。如梧子。大每服七十丸。空心。鹽湯下。

○一治遺尿不禁。

雞胫脰

丁貝并與地大穢淨不用水洗男用雞經女用雞細

右為細末每服二錢空心滾白湯調下二三服即愈

○一治遺尿失禁

益智仁七個桑螵蛸七個為末酒調服用熟白果七個送下

○一治夜多小便用

益智子二十四個研碎入鹽同煎服

○一治小便多者

草薢夜煎服之永不夜起

○一治夜多小便

用胡桃反火煨熟臨臥溫酒嚥下

○一治小便內虛熱者頻數不禁

用六味地黃丸服効

○一氣不足脈微而瀉小便頻數用小茴香不拘多少同鹽炒為末取精

米糕下片炙軟熟雜藥吃立効

○一治小便頻數用猪尿胞洗淨以糯米煮爛入椒少許同煮去米只取胞切吃

○一治小便遺尿失禁多是氣虛以益氣湯去柴胡加茯苓熟地黄肉桂益智仁

○一治小便頻數或勞而益甚屬脾氣虛弱以益氣湯加山藥五味子

○一論身體虛瘦夜常遺尿失禁
人參 八分 白朮 一錢
山藥 一錢 益智仁 七分
當歸 一錢 白芍 一錢
黃芩 一錢 酸棗仁 七分
甘草 四分

右剉作下劑水煎服

○一論遺尿失禁身體虛瘦

補中益氣湯方見內傷依木方去柴胡加山藥一錢益智仁七分山藥黃肉七分白芍酒炒一錢酸棗仁炒七分

○一人因勞發熱小便自遺或時不利余作肝火陰挺不能約制午前用
補中益氣加山藥黃柏知母午後服地黃丸月餘諸症悉退此症若服
燥劑而頻數或不利用四物麥門五味甘草若數而黃用四物加山藥
黃柏知母五味麥門若肺虛而短少用補中益氣加山藥麥門若陰挺
痿痺而頻數用地黃丸而愈。

○一論腎與膀胱俱虛氣衰之不能約制故遺尿不約或睡中自出
加味地黃丸

懷生地黃酒蒸四兩 懷山藥二兩

牡丹皮一兩五錢

白茯苓一兩

山茱萸酒蒸去核

破故帛炒二兩

益智仁一兩

人參一兩

肉桂五錢

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服百丸空心鹽湯下

○一小便桶內起泡盈相此腎氣衰也用紅雞冠花為末每服三十錢空心

溫酒調下

小便閉

小便不通由膀胱與腎俱有熱故也腎主水膀胱為津液之府此二經為表裏而水行於小腸入胞者為小便腎與膀胱既熱熱入於胞熱氣太盛故結澀令小便不通小腹脹滿氣急甚者水氣上逆令心急腹滿乃至於死診其脈緊而滑直者不得小便也

○一論膀胱有熱小便閉而不通也

導水散

當歸

藎麥

車前子

滑石

赤茯苓

澤瀉

猪苓

木通

石蓮子 去殼 山梔子

黃連

黃柏 酒炒

知母 酒炒

甘草

右剉燈草煎空心溫服

○一論小便不通百法不能奏効服此無不愈

禹功散

陳皮

半夏姜製

赤茯苓

猪苓

澤瀉

白朮炒

木通

條芩

山梔子炒 銛升麻三分

甘草二分

右剉一劑水二鍾煎至一鍾不拘時服少時以鷄翎蘸痰吐之得吐而止妙在吐聲之滴水之器閉其上竅則經枝之則水通流洩矣

○一論溲溺不通匪細故也期朝不通便令人嘔名曰關格又曰不通而危矣一見嘔症便不可救經曰出入廢則神機化滅升降息則氣立孤危此之謂也

○一論小便閉塞用涼藥過多而不通者是元氣虛而不能輸化也以補中益氣湯主之

○一論小便淋瀝不通以六味丸倍茯苓澤瀉

○一論小便不通先將麝香半分填患人臍中上用葱白用蠟各搗爛成

壽世保元

戊集五卷

辛八

餅封于臍上用布帶縛住良久以下用皂莢燒燬置入陰中其水竅自通
婦人亦用皂莢煎湯薰洗便處即通

○一論小便不通膀胱熱者

朴硝為細末每服二錢七茴香煎酒調下

○一論小便不通腹脹

土茯苓炒黃為末黃酒調下

○一論小便不通用猪膽投熱酒中服之立通

又方用蚯蚓研以冷水濃濃汁服半碗立通大能熱疾不知人事欲死者服之立効

○一論小便不通臍下滿悶者

海金沙一兩 臘茶五錢

木為劑末每服三錢生薑甘草稍煎湯調下

○一論小便不通兩尺脈俱沉微乃陰虛故也過服通利滑寒涼之藥不効

大附子一枚重二兩者炮去皮臍鹽水浸淨瀉兩味剉作四劑每服水一盞燈心七根煎食遠服

○一論小便不通體腫喘嗽用補中益氣湯金匱腎氣丸兼服

○一人小便不通服涼藥過多脹滿幾死以附子理中湯加琥珀末

○一婦人病飲食如故煩熱不得臥而反倚息以附子理中湯加琥珀末

此病名曰轉脬但利小便則愈八味丸主之方見補益

○一治男子消渴小便反多婦人轉脬小便不通宜服八味丸○又治婦

人陰冷

立齋云治老人陰痿思色精不出內敗小便道澀痛如淋八味丸加車前

子牛膝

若老人精已竭而復耗之大小使牽痛愈痛愈欲愈使則愈痛此藥最效

八味丸見補益

○一治小便不通用蠶蚶一箇焙熟嚼吃黃酒送下立通

○一治小便不通并傷寒雜症而不可以藥通利者用此藥立通。

皮硝煎化用青布蘸水搭臍上并小便上熱則易之。

○一治小便不通已經七八日遍身手足腫滿諸醫因効余以紫蘇煎湯

入大脚盆內令病人坐上薰蒸冷則添滾湯外用鹽炒熱熨臍上遍身

腫處良久便通腫消而愈。

○一治小便不通小腹脹滿不急治即殺人。

連根葱白一斤搗爛炒熱以布裹分作兩處更替熨臍下即如加步

麝香丸妙。

○一治小便不通諸藥無效或轉胞至死此法用之小便自出。

猪尿胞一箇傾出尿用鵝毛筒去頭尾插入窠孔內線扎定以口次

氣令滿胞用線管下再扎住將管口放在小便頭上荷敷孔解後下

線手搓其氣透裏自然小便即出効。

大便閉

脉多沉伏而結陽結脉沉實而數陰結脉伏而遲或結者人虛人便結脉雀啄者不治。

夫陰陽二氣貴乎不偏然後津液流通腸胃潤益則傳送如經矣。若夫至理三焦氣滯運轉不行遂成閉結之患其患有五曰風閉氣閉熱閉寒閉濕閉是也更有發汗利小便及婦人產後亡血走耗津液往往皆能令人閉結燥則順之滋則活之閉則通之寒則溫之熱則清之此則一定之法也。

○一論太臟實熱大便閉結不通用大黃皮硝牙皂三味各等分水煎一服立通。

又方用大黃末三錢皮硝五錢用好燒酒一碗泡化服之立通。

又方用皮硝五錢熱酒化開送去渣加香油三四茶匙服立通。

○一論此大便難，胸膈不寬，上衝氣，胃不降，腹脹，不食，後因氣不舒，宜在幽門以辛潤之，專治大腸血少，結燥不潤。

潤腸湯 通幽湯 去木黃 火麻仁

當歸稍五分 生地黃二錢 熟地黃二錢 枳仁五分

紅花五分 升麻一錢 火麻仁一錢 大黃一錢

甘草五分

右剉水煎去渣，調檳榔末二錢，稍溫服。

○一論大便閉結至極，昏不知人事，用大田螺二十枚，以鹽丁小撮和壳生搗碎，置病人臍下，一寸三分，用寬帛繫繫之，即通。

○一論大便閉結。

導氣丸

木香 檳榔 火麻仁 枳殼

右將枳殼每個切作四片，用不銹耳用三寸，生薑五片，巴豆三枚，略搗。

碎不去殼油用米一盞將枳殼同煮熟濾去三味不用只將枳殼剉細焙乾爲末入前三味末煉蜜爲丸蜜湯下不拘時服。

○一治大便不通

烏柏木方停二寸劈破以水煎取小半盞服之立通不用多喫極禱

○一人大小便閉數日不通用商陸搗爛敷臍上立通

○一論自汗大便秘結不通且便於老人并日久不能服藥者

蜜煉如飴乘熱擦如指長一寸兩頭如銳納谷道中良久下燥者加皂角末少許更効

香油導法

用竹管蘸葱汁深入大便內以香油一半溫米一半同入猪尿胞內擦入竹管將病人倒放脚向上立時即通

○一論自汗小使利而大便燥硬不可攻以此方導之

猪膽道法

猪膽一枚，傾去一小半，仍入好醋在內，用竹管相接，套入谷道中，以手指撚之，令膽汁直射入內，少許即通，蓋酸苦益陰以潤燥也。

○一論大便不通，并傷寒雜症，用藥不行者。

粟米水煮至熟，入大麻仁微炒，不拘多少，入粥內，再煮二三沸，飲湯，即通。

○一論虛弱老人，大便秘澀不通。

潤腸丸

杏仁炒去尖 枳殼炒去穢 大麻仁炒 陳皮炒 阿膠炒

防風各二分

右為細末，煉蜜為丸，如梧子大，每服五十丸，白湯送下。

○一老儒素有風熱，飲食如常，大便秘十七日不通，肚腹不脹，兩尺脈洪大，而虛，此陰火內燠，津液用六味丸二十餘劑，至三十二日始欲，用猪

膽潤而通利如常

○一婦人年七十有二痰喘內熱大便不通兩月不寐脈洪大重按微細此屬肝肺略虧損朝用六味丸夕用逍遙散各三十餘劑許所進飲食百餘碗腹始痞悶乃以猪膽汁導而通之用十全大補調理而去若聞前藥飲食不進諸症復作

○一治老人大便閉澁連日不通

火麻仁一盞半研水浸取汁芝麻半盞炒研水浸取汁荆芥穗一兩
枳殼七錢炒
杏仁五錢去皮尖
一治太便秘常閉結宜久服

○一治血潤燥丸

當歸二兩酒洗
懷生地黃一兩
懷熟地黃一兩
火麻仁一兩

枳殼七錢炒
杏仁五錢去皮尖

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服七十丸空心溫水送下

○一治木便不通

大黃

皮硝

牙皂

右三味各等分。水煎，下服立通。

二便閉

○一論木小使不通。關格不利。燒皂角，細研，粥飲下三錢立通。

一方用不蛀皂角，安瓦上燒着，置馬桶內，坐上薰其葉門自通。

二便閉結甚難醫

急炒鹽來塞滿臍

蒜片覆鹽堆艾燻

利便良法少人知

○一論葱豉餅專治老人木小使不通。

生薑 半兩

葱白

根葉

一盞 一盞

豆豉 三十粒

右搗爛安臍中，須烘熱臍中，以帛扎定，良久氣透即通，或再換一餅。

又方用蜂蜜一鍾，入皮硝二錢，滾湯一茶鍾化下。

○一治大小便不通

明礬末一匙安臍中。冷水滴之。冷透腹內。自然通。如起背灸無腳孔。即於灸盤上用帛作圈。子籠灸盤。在礬末在內。仍以水滴之。若分卒無藥。以猛燒過入臍內。蒜片上灸之。

○一論關格脹滿。大小便不通。

獨蒜燒熟去皮。綿裹納下部。氣立通。冷即易。腹滿不能服藥者用之。

○一論大小便不通者。此氣閉也。

皂角去皮子炙不拘多少。為細末。酒打麩糊為丸。如梧子大。每服三十丸。酒送下。

○一論大小便不通。此方治之殊効。

蝸牛膏

用蝸牛三枚。去殼搗為泥。加麝香少許。納臍中。以手揉按。即立通。

用田蠶亦可

○一治大小使不通。

六七月間尋牛糞中有犬蟻蛭不拘多少用線串起陰乾收貯用時取一箇要全者放淨磚上四面以炭火烘乾以刀從腰切斷如大便閉用上半截小使閉用下半截各為細末新汲水調服二使俱閉者則全用之。

○一治大小使不通。

猪牙皂角末猪膽汁調符管吹入糞門○小使不通葱津吹入馬口愈

○一人大小使不通十餘日腹脹欲死諸醫用硝黃牽巴等藥罔効予以

冬葵子丁劑水煎服立通。

○一論大小使不通垂危者

甦危散

苦瓜蒂 五錢 川烏 炮

草烏 炮

香白芷

牙皂 炮

細辛各三錢 胡椒一錢 麝香少許

右為細末，用小竹筒將藥少許吹入肝內，即通神速。

○一論臟腑實熱，或小便不通，或大便不通，或大小便俱不通。

顛倒散

大黃六錢 滑石三錢 皂角三錢

右為細末，溫酒送下。如大便不通，依前分兩。如小便不通，黃三石六角。如前如大小便俱不通，黃石均分，角亦如前。

○一治大小便不通，百方不效，肝腹脹痛，咽喉飽塞，或痰壅感氣，喘傷寒結胸，臥不側床，水米不下，死在須臾。此幽門氣閉不通，用甘遂五分，葱漿水煎熟，散出為末，入麝香三厘，用紙搗為丸，淡姜湯下，立通。或小便不通，或大便不通，或大小便俱不通者，皆效。

痔漏

膨沉小窳者易治浮洪而軟弱者難愈

夫痔漏之原由乎酒色過度濕而生熱充乎臟腑溢于經絡痿于谷道之
左右衝突為痔久而成漏者也痔輕而漏重痔實而漏虛治痔之法不
過涼血清熱而已至於治漏初則宜涼血清熱久則宜滋養殺蟲
而兼平溫散也或曰痔漏久是根源何故而用溫滋殊不知痔止出血
始終是熱漏流膿水始是濕熱終是濕寒不用溫藥何以去濕而散寒
乎非止痔漏百病中多有始熱而終寒者如渴疽如嘔吐初作則腸胃
氣實而熱久作則腸胃氣虛而為寒矣

○一論痔瘡腫痛初起立效

祛風辟毒湯

黃連 一錢

黃芩 一錢

連翹 五錢

赤芍 一錢

枳殼 一錢

大黃 錢五分

苦參 一錢

黃柏 一錢

槐花 一錢

右剉水煎空心服為末水丸用溫水下亦可

○一論內經曰二陰皆屬腎雖見症於木腸實陰虛而火盛也
祛毒養榮湯

當歸一錢

芍藥二錢

生地黄酒洗一錢

黃連酒炒一錢

黃芩一錢

黃柏酒炒五分

知母一錢

連翹一錢

升麻五分

荆芥一錢

槐角二錢

皂角子二錢

皂角刺二錢

天花粉二錢

黃芪一錢

人參七分

甘草節一錢

右剉一劑水煎空心熱服遠酒色則全愈

○一論千金不換刀圭散治痔漏百發百中。方見中風

○一論專治通腸痔漏

濟生蓮蒞散

蓮蒞焙一兩

當歸五錢

五倍子五錢

黃連五錢

乳香五錢

沒藥五錢

礬紅四錢

錦紋大黃半斤

黑丑頭末 炒一兩

右共丸味為細末欲服藥前一白勿食晚飯次日空心用淡猪肉汁一
鍾好酒一鍾半和猪肉汁前秤藥一錢二分調服午後于淨黃土上疎
宣時見出為驗或如爛杏五色相雜亦為驗矣如散藥難服用酒糊丸
如葦豆大每服一錢五分淡猪肉湯下此方神効不可輕忽切忌燒酒
色慾發物魚羊木肉

○一論治痔漏累驗

蝟皮丸 長葛張明山傳

刺蝟皮酒一箇連刺當歸酒洗二兩

槐角酒浸炒二兩

黃連酒炒二兩 地骨皮酒炒乾二兩

甘草蜜炙二兩

乳香二錢 核桃十箇內取隔三十六片

右為細末醋糊為丸如梧子大每服二十五丸白湯或酒早晚二服一
月後平復神効

○一論凡人衣食豐饒，患疔必于於飲食色慾所致。及有乘酒犯房，若要除根，必須服此滋陰補內之藥，宜戒醇酒厚味，寡慾可也。

臟連固腎丸

懷生地黃 六兩 山藥 四兩 山茱萸肉 四兩 白茯苓 去皮 三兩

牡丹皮 三兩 澤瀉 二兩 黃連 淨 四兩 黃柏 去皮 四兩

知母 去毛 三兩 槐角 三兩 人參 三兩 當歸 二兩

皂角 二兩 天花粉 二兩

右各為細末，用雄猪木臟丁，良去脂油，搗藥末于內，兩頭用絲綿縛住，用糯米二升，煮飯，將半熟，撈起，去湯，將藥腸盤藏于飯中，如蒸飯之熟，待冷些，取出去兩頭，無藥綿纏之腸，將藥腸入淨石臼內，杵爛，揀出腸渣，散如不粘，加些飯，炒之好丸，如梧桐子大，晒乾，每服百丸，空心白滾水送下。

○一論痔漏多年不癒者，此也。

收功補漏丸 臨川徐思齊

白茯苓去皮 赤茯苓去皮 沒藥各二兩 破故帛四兩

右藥俱不犯鐵器於石臼搗成塊春秋酒浸三日夏一日冬五日取出木籠蒸熟晒乾為末酒糊為丸如梧子大每服二十丸緩緩加至五十丸止空心溫酒送下元管以此方加入全料大味地黃丸同作一處同丸服治年久漏不愈者一料全愈

○一論漏瘡先須用補藥以補氣血用參芪歸木為主木劑服之外以附子為細末津調作餅子如銅錢厚以艾多灸之漏大者艾炷亦大漏小者艾炷亦小灸令微熱不可令痛餅乾即易之再和再灸又以補氣血藥作膏貼之

○一論痔瘡膿血淋漓口乾作渴肺熱便血自汗盜汗以益氣湯加茯苓半夏炮乾薑脾胃漸省後用六味丸兼進而愈

○一治蓮花痔瘡 余紹坤得効

黃連 三錢

烏梅 三十

大黃 三錢

穿山甲 三錢

右剉，丁劑水煎，空心溫服。

補遺

○一治痔漏熱症有瘀血作痛，取出惡物，通利大小腸。

川芎

白芷

赤芍

枳殼

阿膠 炒

莪朮

生地黃

茯神

木通

五靈脂

桃仁

大黃

白茯苓

甘草

右剉，一劑生薑三片，蜜二匙，水煎，食前服，以利為度。

○治痔漏脫肛便血方。

川黃連

多用酒浸約二日許淨

枳殼

去穰 炒

防風

去蘆 二兩

當歸

全用 四兩

右四味為細末，以前浸黃連酒和麵糊為丸，如梧桐子大，每服七八十。

九空心米飲或粥湯送下。已煎炒酒麴羊鵝魚腥之物。

生肌散

五倍子炒黃色 乳香

沒藥

孩兒茶各一錢

白蔘補五分

右為細末，每次用竹管吹入漏瘡口內。

○一治痔瘻道中蟲痒不止，用汞銀裏膏各二兩同研，相和然如聚形狀，薄綿片裹內下部，明白蟲出，若痛者如用三分作丸。

融氣

大香散 肉齒秘傳

琥珀

乳香

各一錢五分

白膠香

三錢

白芷

二錢

當歸

蛤粉

各一錢五分

枯礬

三錢

密陀僧

五錢

右為細末，洗淨，腋下每日擦之，有加銅線者。

○一治瘡氣方

蜘蛛一箇生旋大者將瓦煨罌二箇一盛二盞泥封固火煨輕粉二錢枯丁一錢赤石脂一錢先服通藥後用自已小便洗以此擦之

○一治體氣并口齒惡臭方
丁香 五錢 藿香葉 零零香 甘松 各三兩 香附

白芷 當歸 桂心 檳榔 益智仁 各一兩

白豆蔻 去壳 麝香 五分

右為細末煉蜜為丸柝干下丸如梧子大每嚼五丸至干且身體散香

○一治體氣方

枯礬一錢 輕粉二分 蛤粉二錢 密陀僧 五分

右為細末研勻每以少許擦之

○一治服氣方

烏龍丸

當歸 酒洗 懷生地 搗爛 白茯苓 去皮 甘枸杞子 炒一兩

石蓮肉炒一兩 蓮蕊焙五錢 丁香三錢 木香五錢

青木香五錢 乳香五錢 京墨五錢 水片分五厘

右為細末，用陳米飯荷葉包燒過，搗爛入地黃為丸。如黃豆，大麝香二分，黃酒化為衣，每服三四丸，臨臥半饑半飽用砂仁一二分炒入茶

酒內送下，婦人加烏藥醋炒三錢，香附米童便炒三錢。

收功後藥

人參 當歸 生地黄 乳香 沒藥

官桂 木香各一錢 麝香八味用 青皮 陳皮

白芷 良姜 麻黃 米殼 甘草各一錢

右劉木煎服出汗外，用枯礬川椒各一兩為末，擦腋下，終身忌鹹魚羊肉，去大小便不可與女人同廁。

○一治胡臭神方

真輕粉研細，先用和洗，令淨，次搽上藥，立愈，每日搽一次，搽一月。

而斷根何以知其效也其意人多隱油耳若病根已去則油身自乾此為驗也。

○一治腋氣五更時用猪精肉二天片以甘蔗末二兩拌之挾腋下至天明以生甘草二兩煎湯飲之良久瀉出穢物類在荒野之處則可恐穢氣傳入故也依法三五次即愈虛弱者間且為之其他密陀僧胡粉之類皆寒藥以治其未耳。

○一治體氣秘方專治五膈五噎痞塞諸虛百損五勞七傷體氣口氣類氣一切諸般臭氣初服一七百體遍香若常服身體康健壯陽滋腎神益丹田其功不可盡述。

透體異香丸

沉香

木香

丁香

藿香

沒藥

甘松

縮砂

丁皮

官桂

白芷

零荳香

細茶

香附子

孩兒茶

白豆蔻

壽世保元

戊集五卷

全九

檳榔

人參各一兩 乳香

檀香

三奈

細辛

益智仁

當歸

川芎

烏藥各五錢

麝香

朝腦各一錢 薄荷一兩

右先將大粉草半斤剉片水煎汁去渣將汁熬成膏將前藥為末煉蜜
并膏搗和為丸如芟實大清晨陰化下九黃酒送下忌生冷毒物解之

沐浴方

防風

荆芥

細辛

當歸

羌活

獨活

皂角

藿香

白芷

藁本

番白草

水紅花

川芎

甘松

右剉水煎沐浴令以香肌膚去風癬

脫肛

脈小而緩者易愈

夫脫肛者乃虛寒下脫其病或因腸風痔漏久服寒涼坐勞而下脫或因
久痢裏急窘迫而脫也。又有產婦用力過多及小兒啼號努氣久痢不
止風邪襲虛而脫也。

夫脫肛者肝門番出也。蓋肺與大腸為表裏。肛者大腸之門。肺虛則因
結虛寒則脫出。腎主大便故肺腎虛者多有此症。若大腸濕熱用升陽
除濕湯。若血熱用四物加祿次槐花。血虛四物加白朮茯苓。兼痔加黃
連。攪花升麻。虛弱用補中益氣湯。加芍藥。腎虛六味地黃丸。主之。
升陽除濕湯 自下而上者引而竭之。

升麻

柴胡

防風

猪苓

澤瀉

蒼朮

陳皮

神麴

麥芽

甘草

右劉水煎。空心溫服。○胃寒腸鳴加益智半夏。
○一論脫肛乃脾肺虛寒下脫。肛門翻出也。

提乳散

黃芪 蜜炒

人參

白木 炒

當歸 炒

白芍 炒

乾薑 炒

柴胡

升麻

羌活

炙甘草

右剉水煎服。

洗法

用五倍子三錢白礬一塊水煎溫洗以芭蕉葉或荷葉緩緩托之。

○一方以蜘蛛七箇燒有性為末每少許香油調佳。

○一方以生蜘蛛搗搭臍上即收。

○一方以死龍頭一枚燒令烟盡搗末敷上以手按按之。

○一方以烏龍尾即梁上塵灰同鼠糞和之燒烟於桶內令坐其上薰之數遍即止不脫為効。

○一治太便脫肛翻出腫痛。

○一治太便脫肛翻出腫痛。

有茨生栢斫子川黃連各一兩以酒二壺每早空心服。

○一論脫肛者肛門翻出虛寒脫出也益氣湯去柴胡加生地白芍茯苓

桔梗炒乾薑黃連黃芩

○一治脫肛氣熱者宜

能騰五分 片腦一分 孩兒茶二分

右為末以人乳調搽肛上熱汗自下而肛收矣

諸虫

脉沉實者生虛大者死○尺脉沉而滑者為寸白蟲○厚朴除疳服康

者生動急者死

外臺云蟲脉當沉弱而弦今反洪大即知蛔蟲甚也

九蟲形狀

一曰伏蟲長四寸為羣蟲之長

二曰蛟蟲又曰長蟲動則吐清水出則心疝黃心則殺入

三曰白蟲長一寸又曰寸白蟲相生子孫轉大長至四五寸或再轉為

弱而動或因食甘肥不節其動則腹痛發作時去來上下痛在
息亦攻心宿口喜吐涎及吐清水貫傷心者死

四曰肉蟲狀如爛杏令人煩滿

五曰肺蟲狀如鷄令人咳而聲嘶

六曰胃蟲狀如蝦蟆令人嘔逆吐喜噦

七曰弱蟲狀如瓜瓣又名隔蟲令人多噦

八曰赤蟲狀如生肉令人腸鳴

九曰蟻蟲形空細微狀如菜蟲居洞腸之間因臟腑虛弱而發動則為
痔為疥癬因入瘡處以生諸癰疽癬瘰癧疥癩蟲無所不為

殺道蟲者由胃弱腸虛而蟻蟲下乘也殺道肛門太腸之候蟻蟲者九蟲
之內下蟲也在於腸間若臟腑氣爽則不妄動胃弱腸虛則蟻蟲乘之
輕者或痒或蟲從谷道中滋出重者侵於肛門瘡爛

○一論諸般痞積面色痿黃肌羸瘦四肢無力皆緣內有蟲積故好食

生米或好食壁泥或好食茶炭鹹辣等物者是蟲積只此一服除根
拍迷七氣湯

青皮 去穢

陳皮

三稜 醋炒

莪朮 醋炒

香附

益智仁

藿香

官桂

桔槔

大黃

檳榔

甘草

右剉水煎露一宿五更空心溫服不得些少飲食不然則藥力減而蟲積不行矣服藥頃肚腹必疼當下如魚刺或長蟲或血脈至日午蟲積下盡方用溫粥止之後服退黃丸下料全愈

退黃丸

平胃散 六兩

線蓉 一兩

右用醋糊為丸如梧子大每服六十丸棗湯送下忌生冷發氣熱等物

萬應丸 治諸蟲

大黃八兩

黑參半斤

煨術四兩

九二

右為細末用苦練根皮一斤皂角不蛀者十錠用米二大碗煎成薄糜和前三味藥為丸如梧子大外用沉香木香雷丸各下兩為細末先用沉香為衣後用木香雷丸為衣每服三丸四更時分用沙糖水送下

○一論蛭蟲或心如刺口吐清水用生艾取汁宿勿食但取肥香脯一方亦片先吃金龜聞香然後飲汁當下蟲

馬寶服

化蠶丸

青黛

蘆薈

胡黃連

蕪荑仁

蝦蟆燒灰

川芎

白芷

各等分

右為細末豬膽汁浸蒸糕丸如麻子大每服下二十九食後臥時杏仁湯送下

○一治下部生蟲蝕其肛爛見五臟便死。

艾葉入雄黃末入管中薰下部令烟入即愈。

○一治下部蟲痒。木棗蒸取膏以水銀和捻長三寸以綿裹宿納下部中。明日蟲皆出。又治痔痛。

○一治蟲已蝕下部肛盡腸穿者取長股蝦蟇青背者下枳雞骨下分燒為灰。合吹下部令深大効。

○一論婦人陰中生瘡如蟲咬痛用。

椎葉搗爛纏裹納陰戶中。下日換三次即效。

○一論婦人陰蝕瘡陰戶中有細蟲其痒不可當食入臟腑即死。令入發寒熱與癆症相似用。

猪肝切作木片以花椒葱拌猪油煎乾待冷納陰戶中少填取虫。再換下片其蟲入肝盡出再用後方洗之。

洗桐散

壽世保元

戊集五卷

卷三

五箇子

花椒

蛇床子

苦參

白藜

葱各等分

右水煎服，神效。

新刊醫林狀元壽世保元戊集五卷